13. Tagung des Arbeitskreises Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft

vom 12. bis 14. Mai 1994 in Tharandt

Bodenbildung in periglazialen Deckschichten unter besonderer Berücksichtigung der präquar- tären Verwitterungssubstrate

H. J. Fiedler, W. Hofmann, U.-G. Linnemann,
W. Nebe, K. Thalheim

(zusammengestellt von U.-G. Linnemann)

Programm

Do 12.5.94: Vorträge und Sitzung des AK Paläopedologie

17.30 Eröffnung (H.J. Fiedler, A. Semmel, H. E. Stremme)

17.45 U.- G. Linnemann: Geologischer Bau des Exkursionsgebiets

18.00 W. Hunger: Die Böden des Erzgebirges

18.45 A. Semmel: Deckschichtengliederung in Deutschland

19.00 K. Thalheim: Mineralogisch-granulometrische Untersuchungen
an Deckschichten im Osterzgebirge

19.15 P. Felix-Henningsen: Definition und Abgrenzung von Böden
und Bodenmerkmalen unterschiedlichen Alters

19.30 Arbeitskreissitzung

20.00 gemeinsames Abendessen im Burgkeller in Tharandt

**Fr. 13.5.94: Busexkursion Teil I: Präcenomane Verwitterung,
Cenomantransgression, tertiäre Verwitterung und
pleistozäne Deckschichten**

8.00 Abfahrt ab Tharandt Markt

Dresden-Plauen/Ratsteinbruch: Cenomantransgression

Dresden-Plauen/Hoher Stein: Cenoman/Klippenfazies

Ölsa/Götzenbüschchen: Typuslokalität der präcenomanen
Verwitterung

Tharandter Wald/Kannhenkelweg: Rotlehmprofil

Hartha/Glasbruch: präcenomane Verwitterung auf Quarzporphyr

Tharandter Wald/Catena S-Berg: pleistozäne Deckschichten (7
Bodenprofile)

gegen 17.30 Rückkehr nach Tharandt

20.00 gemeinsames Abendessen im Burgkeller in Tharandt

Sa 14.5.94: Busexkursion Teil II: Pleistozäne Deckschichten

8.00 Abfahrt ab Markt Tharandt

Tharandter Wald/Catena Buchhübel: pleistozäne Deckschichten (6
Bodenprofile)

12.30 Ende der Exkursion am Bhf. Tharandt mit S-Bahn-Anschluß
nach Dresden Hbf. (an 12.54)

Inhalt

1. Der geologische Bau des Tharandter Waldes und seines Rahmens.....5
2. Standortverhältnisse des Tharandter Waldes.....30
3. Exkursion Teil I: Präcenomane Verwitterung, Cenomantransgression, tertiäre Verwitterung und pleistozäne Deckschichten37
4. Exkursion Teil II: Pleistozäne Deckschichten93

Anschrift der Autoren:

Prof. H.J. Fiedler, Prof. Nebe, Dr. W. Hofmann:
 Technische Universität Dresden, Institut für Bodenkunde und
 Standortslehre, Piener Str. 7, Tharandt, 01737

Dr. U.- G. Linnemann:
 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für
 Geowissenschaften, Burgweg 11, Jena, 07749

Dr. K. Thalheim:
 Staatliches Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden,
 Augustusstr. 2, Dresden, 01067

Lage der Exkursionspunkte

1. Der geologische Bau des Tharandter Waldes und seines Rahmens

1.1. Einleitung

Der geologische Aufbau des Tharandter Waldes und seines Rahmens ist kompliziert und setzt besonders für das Verständnis der präkambrischen und altpaläozoischen Abfolgen eine komplexe Betrachtungsweise unter Beachtung des Bauplans der östlichen Varisziden voraus.

Das im Gebiet des Tharandter Waldes ausstreichende Grundgebirge umfaßt Teilbereiche des Erzgebirgs-Antiklinoriums und des Elbe-Synklinoriums, einem Segment der Elbezone. Beide Grundgebirgs-einheiten stellen wesentliche Bestandteile des Saxothuringikums dar und werden durch die Mittelsächsische Störung getrennt. Die Elbezone als eine der bedeutendsten parallel zur Südwestflanke der Osteuropäischen Tafel (Tornquist-Teisseyre-Linie) verlaufenden lineamentären Bruchzonen verdient besondere Beachtung. Sie verläuft senkrecht zum NE-SW-Streichen des Saxothuringikums und trennt die Lausitzer von der Fichtelgebirgisch-Erzgebirgischen Antiklinalzone (siehe Abb. 1 & 2). Der Lausitzer Block mit vorwiegend statischer Metamorphoseprägung und proterozoisch-frühpaläozoischer Konsolidierung steht dem Erzgebirgsblock mit altpaläozoischer Hauptphase der Konsolidierung und dynamometamorpher Entwicklung gegenüber. Ein Umschwenken der variszischen Hauptfaltenachsen aus dem westlich der Elbe vorherrschenden erzgebirgischen Streichen in die herzynische Richtung erfolgt am Kreuzungspunkt Zentralsächsisches Lineament - Elbezone (etwa 10 km westlich des Tharandter Waldes - siehe Abb. 1 & 2). Dieses Umbiegen der variszischen Hauptstrukturen ist auf eine bedeutende NW-SE-gerichtete dextrale Blattverschiebung der Lausitzer Antiklinalzone gegenüber dem Erzgebirgs-Antiklinorium zurückzuführen. Ehemals NE-SW-streichende altpaläozoische Sedimentabfolgen (Kambroordovizium bis Unterkarbon) der Ostthüringisch-Nordsächsischen Synklinalzone (insbesondere nördlicher Schiefermantel des Granulitgebirges sowie "Strehleener Gebirge" bei Riesa) und der Vogtländisch - Mittelsächsischen Synklinalzone (insbesondere

Abb. 1

Geologische Übersichtskarte des Sächsisch-Thüringischen und Nordostbayerischen Grundgebirges. E. L. = Erbindorfer Linie, E. S. = Elbetalschiefergebirge, F. Z. = Frankenberges Zwischengebirge, H. G. S. = Hirschberg-Gefell-Sattel, L. Ü. = Lausitzer Überschiebung, L. Z. M. = Lößnitz-Zwönitzer Mulde, St. B. = Stockumer Becken, W. M. = Waldsassener Mulde, W. N. S. = Wilsdruff-Nossener Schiefergebirge, W. Z. = Wildenfelses Zwischengebirge; Z. T. M. = Zone von Tirschenreuth-Mähring. (aus WALTER, 1992)

Frankenberger Zwischengebirge / Zentralsächsisches Lineament- siehe Abb. 2) wurden in die NW-SE-streichende Elbezone eingeschleppt und südvergent deformiert. Aus ihnen bestehen die Schiefergebirge (Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge und Elbtalschiefergebirge) zwischen der Lausitzer und Fichtelgebirgisch- Erzgebirgischen Antiklinalzone. Das Alter der Blattverschiebung, die PIETZSCH (1962) bereits vermutete, läßt sich auf einen relativ geringen Zeitraum eingrenzen. Die möglicherweise mehrphasigen strike-slip-Bewegungen wurden während der variszischen Hauptdeformation (sudetische Phase / Unterkarbon III β) initiiert und endeten vor dem Einsetzen des oberkarbonischen Rhyolithvulkanismus im Osterzgebirge und den sächsischen Zwischengebirgen. Auch der postsudetisch intrudierte Magmatitkomplex des Meißner Massivs (siehe Abb. 2) wurde randlich von Scherbewegungen deformiert.

Das tektonisch labile Gebiet wurde nach der sudetischen Phase mehrfach aktiviert. Ausdruck dessen sind z.T. erhebliche Sedimentakkumulationen in durch Dehnungsstrukturen vorgezeichneten Ablagerungsräumen während des Rotliegenden (Döhlener Becken) und der Oberkreide (Elbe-Senke) sowie oberkarbonische, rotliegende und tertiäre Vulkanite an Kreuzungspunkten größerer Störungszonen.

Känozoische Sedimente werden durch reliktsche Tertiärvorkommen, pleistozäne Schotterterrassen und Lößablagerungen sowie quartäre Boden- und Moorbildungen vertreten.

Weitere Übersichtsdarstellungen über den geologischen Bau des Tharandter Waldes und seiner Umgebung vermitteln die Abbildungen 3.1. und 3.2..

1.2. Verbreitung der geologischen Einheiten im Raum Tharandt

Das Verbreitungsgebiet des Tharandter Waldes umfaßt Teilbereiche der Meßtischblätter Tanneberg-Deutschenbora (Nr. 64), Wilsdruff (Nr. 65), Freiberg (Nr. 80) und Tharandt (Nr. 81) der sächsischen Landeskartierung im Maßstab 1 : 25 000 (siehe Abb. 3). Der Südteil des Kartenausschnitts (Abb. 3) wird durch die jungproterozoischen Gneise des Erzgebirgskristallins beherrscht. Nordöstlich der

Abb. 2 Übersichtskarte der Elbezone im Raum Riesa - Dresden (Meso- und Känozoikum abgedeckt) (nach der Geologischen Karte der DDR im Maßstab 1:200 000 - Blatt M-33-VII-Dresden/Chabarovice und nach Darstellungen von PIETZSCH;1962)

- ETSG - Elbtalschiefergebirge (Maxen-Berggießhübler Synklinorium)
- NWSG - Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge (Nossen-Wilsdruffer Synklinorium)
- ZSL - Zentralsächsisches Lineament (Frankenberger Zwischengebirge)
- W - Weesensteiner Gruppe
- DG - Dohnaer Granodiorit
- MS - Mittelsächsische Störung
- WLS - Westlausitzer Störung
- LÜ - Lausitzer Überschiebung
- 1 - Präkambrium (ungegliedert)
- 2 - präsudetisches Paläozoikum (ungegliedert)
- 3 - Magmatite des Meißner Massivs

erzgebirgischen Metamorphitserien schließt sich das Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge (Kambroordovizium bis Unterkarbon) der Elbezone an. Die beide Grundgebirgseinheiten trennende Mittelsächsische Störung wird bei Tharandt durch eine NNW-SSE-streichende Blattverschiebung um einige Kilometer nach Norden versetzt (siehe Abb. 3). Der Oberflächenanschnitt eines postsudetisch intrudierten Granitplutons ("Niederbobritzcher Granit") befindet sich südwestlich des Tharadter Waldes (Abb. 3). Der oberkarbonische Rhyolithkomplex des Tharandter Waldes stellt einen konzentrisch aufgebauten Effusivgesteinskomplex dar, dessen größter Durchmesser etwa 9 km beträgt. Neben kretazischen Sedimenten nehmen diese sauren Eruptiva die größte Ausstrichsfläche im Tharandter Wald ein. Die rotliegenden Molasseablagerungen und sauren bis intermediären Vulkanite des Döhlener Beckens gehören nicht zum Tharandter Wald i.e.S., bilden jedoch dessen nordöstlichen Rahmen (siehe Abb. 3).

Unregelmäßig und fleckenhaft verteilt liegen die klastischen Kreidesedimente vor. Sie belegen eine ehemals flächendeckende Verbreitung des Cenomans in der Elbe-Senke und dem unmittelbar angrenzenden Nordabschnitt des Osterzgebirges. Die Basaltvorkommen des Landberges und des Ascherhübels (siehe Abb. 3) besitzen ein jungtertiäres Alter. Die Datierung ist durch unterlagernde Oligozän-Sande möglich.

1.3. Grundgebirge

1.3.1. Metamorphite des Osterzgebirges (Proterozoikum)

Das Osterzgebirge als Bestandteil der Erzgebirgs-Antiklinalzone wird durch die Flöha-Querzone vom mittleren und westlichen Erzgebirge getrennt (TGL 34 331/01). Im NW und NE grenzen mit tektonischem Kontakt (z.B. Mittelsächsische Störung) Teile der sächsischen Zwischengebirge an den regionalmetamorph überprägten Komplex. Die SE-Begrenzung des Osterzgebirges wird durch den Erzgebirgs-Abbruch gebildet. Das kristalline Grundgebirge setzt sich jedoch unter den meso- und känozoischen Sedimenten und Vulkaniten

64 - Mtbl. Tanneberg
 65 - Mtbl. Wilsdruff
 80 - Mtbl. Freiberg
 81 - Mtbl. Tharandt

Abb. 3

Legende zu Abb. 3

Geologische Karte des Tharandter Waldes und seines Rahmens (Quartär abgedeckt) (nach Arbeiten von SAUER & BECK, 1886; PIETZSCH, 1912, 1916 a, 1916 b; HÄNTZSCHEL, 1934; TRÖGER, 1969; PRESCHER, 1979; HOTH, WASTERNAK & BERGER, 1980)

Proterozoikum:

- 1 - Paragneise, lokal Metabasite (Osterzgebirgische Serie)
- 2 - Paragneise, lokal Metabasite, Metagrauwacken, Quarzite, Anatexite, Mylonite (Preßnitzer Serie)
- 3 - Metarhyolithoide (Orthogneise) (Preßnitzer Serie)

Paläozoikum:

- 4 - Kambroordovizische bis unterkarbonische z.T. grünschieferfazielle Sedimentabfolgen sowie synsedimentäre Magmatite der Elbezone (Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge) (ungegliedert)
- 5 - Rotliegendes (Döhlener Becken) (ungegliedert)

Meso- und Känozoikum:

- 6 - Cenoman (Niederschönaer Schichten)
- 7 - Cenoman (Oberhäslicher Schichten)
- 8 - Cenoman (Dölzschener Schichten)
- 9 - Oligozän

Magmatite:

- 10 - Diabaslagergänge (Devon)
- 11 - (Niederbobritzsch) Granit (Oberkarbon)
- 12 - Andesit (Rotliegendes)
- 13 - Lamprophyrgänge (Rotliegendes)
- 14 - Quarzarm (Älterer) Porphy (Oberkarbon)
- 15 - Quarzporphy (Jüngerer Porphy) (Oberkarbon)
- 16 - Kugelpechstein (Oberkarbon)
- 17 - Granitporphy (Varietät des Jüngerer Porphyrs)
- 18 - Nephelinbasalt (Olivin-Nephelinit) (Tertiär)
- 19 - Basalttuff (Tertiär)

Tektonische Elemente:

- 20 - Mittelsächsische Störung
- 21 - Störung

des Ohre-Rifts auf dem Gebiet der CSFR nach SE fort.

Die Edukte der Metamorphitserien (vor allem Klastite der Grauwackensuite mit verschiedenen Sediment- und Magmatiteinlagerungen) werden auf lithostratigraphischer Basis zum größten Teil in das obere Proterozoikum eingestuft. Flächenmäßig zurücktretend streichen kambrische Anteile im Osterzgebirge aus (vor allem Phyllite und Glimmerschiefer, lokal mit Karbonatgesteinen).

Der grünschiefer- bis almandin-amphibolitfaziell überprägte osterzgebirgische Metamorphitkomplex weist eine Zonenfolge vom Barrow-Typ auf (HOFMANN & LORENZ, 1975).

HOFMANN (1974) gliederte die oberproterozoischen Anteile des Osterzgebirges in eine Untere und eine Obere Osterzgebirgische Serie. Als trennender lithostratigraphischer Grenzhorizont wird der Quarzit von Oberschöna angesehen. In der jüngeren Literatur setzte sich jedoch die von HOTH, LORENZ, HIRSCHMANN & BERGER (1979) vorgeschlagene Gliederung (Osterzgebirgische Gruppe - siehe Übersicht 1) durch.

Die Osterzgebirgische Gruppe stellt eine maximal 5000 m mächtige monotone Folge von z.T. anatektischen Zweiglimmerpara-

Übersicht 1: Lithostratigraphische Gliederung des erzgebirgischen Präkambriums nach HOTH, LORENZ, HIRSCHMANN & BERGER (1983) und HOTH & LORENZ (1990):

E	H	Niederschlager Gruppe	Kunnerstein-Folge
R	A		Folge von Kovarska
Z	U		
G	P		
E	T	Preßnitzer Gruppe	Folge von Medenec
B	G		(Kupferberger Folge)
I	R		Folge von Russova
R	U		(Reischdorfer Folge)
G	P		
I	P	Osterzgebirgische Gruppe	Annaberg-Wegefarther Folge
S	E		Brander Folge
C			Freiberger Folge
H			
E			

gneisen und Biotit-Kalifeldspat-Plagioklasgneisen mit lokalen Einschaltungen verschiedener Metabasite, Metarhyolithoide, Meta-grauwacken, Glimmerschiefer, Metaschwarzschiefer ("Schwarze Flöze")

Vereinfachtes geologisches Profil durch den Tharandter Wald

Präkambrium:

- 1 - Osterzgebirgische Serie
- 2 - Preßnitzer Serie

Altpaläozoikum:

- 3 - Kambroordovizium bis Unterkarbon der Elbezone (Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge)

Molasse:

- 4 - Rotliegendes des Döhlener Beckens (Perm)

Mesozoikum:

- 5 - Klastische Kreidesedimente

Magmatite:

- 6 - Niederbobritzscher Granit (Oberkarbon)
- 7 - Älterer Quarzporphyr (Oberkarbon)
- 8 - Jüngerer Quarzporphyr (Oberkarbon)
- 9 - Basalt (Tertiär)

Tektonik:

- 10 - Auf- bzw. Abschiebung

Abb. 3.1.

und Quarzite dar.

Die jüngere bis 2900 m mächtige Preßnitzer Gruppe zeichnet sich durch einen lithologisch bunteren Aufbau aus. Den lokal anatektischen Zweiglimmerparagneisen und Zweiglimmerschiefern sind Metarhyolithoide, Metabasite, verschiedene Karbonatgesteine (Marmore, Kalksilikatfelse, Skarne), Metagrauwacken, Granatglimmerschiefer und Gneisglimmerschiefer sowie Quarzite zwischengelagert. Auch in der Preßnitzer Gruppe treten lokal Kohlenstoffanreicherungen (Metaschwarzschiefer = "Schwarze FLöze") auf.

Die Niederschlager Gruppe (Mächtigkeit max. 650 m) setzt sich aus Zweiglimmerschiefern mit Einlagerungen von Grauwackengneisen, Zweiglimmerschiefern, Metabasiten und Quarziten zusammen.

Im Gegensatz zur "erzgebirgischen" Kontour ist ein typisch erzgebirgisches (NW-SE-) Streichen der Hauptstrukturen nur am NW-Rand der Erzgebirgs-Antiklinalzone realisiert. Im Bereich größerer Antiklinalstrukturen (z.B. Antiklinalstrukturen von Freiberg und Sayda) ist ein umlaufendes Streichen der Kristallisationsschieferung ausgebildet, wobei die E-W-Richtung dominiert. Parallel zur Annäherung an die Elbezone schwenken die Hauptstrukturelemente in die NW-SE-Richtung um.

Das Metamorphosealter der proterozoischen Edukte des Osterzgebirges ist als jüngstproterozoisch bis frühpaläozoisch (etwa 600 bis 500 Mill. a) anzunehmen (KRENTZ in LEONARD, KRENTZ, WIEMEIER, HOTH & KEMNITZ, 1990).

Im Gebiet des Tharandter Waldes und seiner Umrandung streichen sowohl Abschnitte der Osterzgebirgischen als auch der Preßnitzer

Gruppe aus (siehe Abb. 3).

Die flächenmäßig gegenüber den Proterozoikums-Ausstrichen stark zurücktretenden kambrischen Anteile des Osterzgebirges (Glimmerschieferzug von Langenstriegis und Phyllitareal von Hermsdorf-Rehefeld) tangieren den Tharandter Wald nicht.

1.3.2. Elbe-Synklinorium (Kambroordovizium bis Unterkarbon)

Das Elbe-Synklinorium als Bestandteil der Elbezone grenzt mit tektonischem Kontakt (Mittelsächsische Störung) an die NE-Flanke des Osterzgebirges (siehe Abb. 1 & 2). Die Rotliegend-Auflagerungen des Döhlener Beckens trennen das Synklinorium in das Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge und das Elbtalschiefergebirge (siehe Abb. 2). Beide Schiefergebirgsanteile weisen einen prinzipiell äußerst ähnlichen Bau auf. Der nördliche Rahmen und Teile des Tharandter Waldes werden durch das Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge gebildet (siehe Abb. 2 & 3).

Die älteste Abfolge des Elbe-Synklinoriums stellt die "Phyllitische Gesteinsgruppe" (PIETZSCH, 1962) dar. Sie grenzt unmittelbar an die NE-Flanke des Osterzgebirges und wird von diesem durch die Mittelsächsische Störung getrennt. Die "Phyllitische Gesteinsgruppe" besitzt ein nicht näher eingrenzbares kambroordovizisches Alter. Eine Umstufung großer Teile der "Phyllitischen Gesteinsgruppe" in das Devon (KUPETZ, 1987) ist nicht haltbar. Die Abfolge wurde durch KURZE, LINNEMANN & TRÖGER (1992) neu bearbeitet und gegliedert (siehe Übersicht 2). Als Bezeichnung wurde

Mühlbach/Häselich-Nossener Gruppe vorgeschlagen. Die Mächtigkeit der Gruppe beträgt im Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge etwa 2000 m. Im Elbtalschiefergebirge geht sie auf 1000 m zurück, wobei auch tektonisch bedingte Mächtigkeitsreduzierungen möglich sind.

Die grünschieferfaziell überprägte Mühlbach/Häselich-Nossener Gruppe besteht überwiegend aus Klastiten, wobei Quarzite im unteren, Phyllite im oberen Teil dominieren. Den Metasedimenten sind synsedimentäre Vulkanite horizontbeständig zwischengelagert. Der Chemismus dieser Magmatite tendiert von sauren initialen Gliedern (Metarhyolite) über intermediäre Stadien (Metadacite).

Übersicht 2: Gliederung der "Phyllitischen Einheit" sensu PIETZSCH, 1962) nach KURZE, LINNEMANN & TRÖGER (1992): (vom Hangenden zum Liegenden)

Müglitz-Herzogswalde-Schichten	tonschieferähnliche Phyllite (z.T tuffitisch)
Seidewitz-Mohorn-Schichten	Phyllite, synsedimentäre Metabasite
Mühlbach-Schichten	Quarzite, quarzitisches Phyllite
Blankenstein-Schichten	Metadacite (Chloritgneis), Kalzitmarmorlagerin mehrerenHorizonten,untergeordnet Phyllite
Langenbrückenberg-Schichten	Quarzite, Quarzitschiefer, Metarhyolithe (Serizitgneis, nur im Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge)

basischen Endgliedern (Metabasite) und ist Ausdruck eines kambro-ordovizischen Riftungsprozesses, der auf sich ständig ausdünnender kontinentaler Kruste angesiedelt ist (LINNEMANN, 1990). Die Metadacite (Chloritgneise) sind mit einer lokalen Karbonatgesteinsentwicklung verknüpft.

An die Mühlbach/Häselich-Nossener Gruppe schließt sich nach Nordosten die "Altpaläozoische Gesteinsgruppe" (Oberes Ordovizium bis Unterkarbon) im Sinne von PIETZSCH (1962) an. Der Kontakt ist wiederum tektonisch (als große Störungszone) ausgebildet. Im Altpaläozoikum der Elbezone sind analog zu den Verhältnissen in der Umrandung der Münchberger Gneismasse und dem Zentralsächsischen Lineament zwei Faziesreihen ausgebildet, wobei eine Abfolge starke Anklänge an die Bayerische Faziesreihe, die andere große Bezüge zur Thüringischen Faziesreihe aufweist (KUPETZ, 1987; LINNEMANN, KURZE, SEHNERT, 1988; KURZE & TRÖGER, 1990; KURZE, LINNEMANN & TRÖGER, im Druck). Die Mächtigkeit jeder dieser Faziesreihen ist schwer abschätzbar, dürfte jedoch 1 000 m nicht überschreiten.

Typische Vertreter der ThüringischenFaziesreihe sind die silurischen Kiesel- und Alaunschiefer mit dem Ockerkalk (ENGERT, 1956; GOTTE, 1956; KUPETZ, 1987), unterdevonische Tentakulitenschiefer (TRÖGER, 1990) und oberdevonische Diabas-Diabastuff-Abfolgen, die mit Karbonatsedimenten verknüpft sind (Diabas-Kalkstein-Serie) (GOTTE, 1953; SCHÜTZENMEISTER, 1963; KUPETZ, 1987). Die Bayerische Faziesreihe zeichnet sich im Elbesynklinorium durch Äquivalente des oberordovizischen Döbrasandsteins, die oberdevonische Hornsteinserie (FREYER & UHLIG, 1963) und die unter-

karbonische Flyschabfolge (z.T. kalkige Grauwacken, Tonschiefer, Keratophyre), in die Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerate eingelagert sind, aus (PIETZSCH, 1962; KUPETZ, 1987; KURZE, LINNEMANN, TRÖGER, im Druck).

Die Autochtonie der Thüringischen Faziesreihe wird allgemein anerkannt. Uneinigkeit besteht hinsichtlich der Bayerischen Faziesreihe. Diskutiert wird eine horizontale Verzahnung der Bayerischen mit der Thüringischen Faziesreihe (Parautochtonie) (z.B. KURZE & TRÖGER, 1990) oder ein Transport der Bayerischen Faziesreihe durch horizontale Deckenschübe (Allochtonie) (z.B. FRANKE, 1984).

Die altpaläozoischen Sediment- und Magmatitabfolgen der Elbezone werden während der sudetischen Phase (Unterkarbon III β) der variszischen Orogenese südvergent deformiert (siehe unter Gliederungspunkt 1.1.).

Die Wirkungen der kaledonischen Orogenese konnten in den Zwischengebirgen Sachsens ausgeschlossen werden, da das prä-sudetische Altpaläozoikum offensichtlich lückenlos entwickelt vorliegt (KURZE, 1968; KUPETZ, 1987; TRÖGER, 1990).

An den Tharandter Wald grenzen nördlich der Mittelsächsischen Störung (siehe Abb. 3) die unteren quarzitbetonten Teile der Mühlbach/Häselich-Nossener Gruppe und devonische Tonschiefer mit oberdevonischen Diabasen (z.T. Lagergänge). Vermutlich oberdevonische Kalklager, die intensiv abgebaut wurden, befinden sich im nördlichen Stadtgebiet von Tharandt und südlich von Braunsdorf. Am Galgenberg streichen in tektonisch komplizierter Position

silurische graptolithenführende Kieselschiefer sowie helle Quarzite, die möglicherweise Äquivalente des Döbrasandsteins darstellen, aus. Das Gelände ist sehr schlecht aufgeschlossen. Die Lagerungsverhältnisse werden durch südvergente Aufschiebungen und N-S-streichende Blattverschiebungen extrem gestört.

1.3.3. Postkinematischer Plutonismus

Nach der variszischen Hauptfaltung setzte ein intensiver postkinematischer Plutonismus ein, der zeitlich in das Oberkarbon gestellt wird (AUTORENKOLLEKTIV, 1972). Im Raum Tharandt sind der Niederbobritzscher Granit (siehe Abb. 3) und das Meißner Massiv (siehe Abb. 2) zu erwähnen.

Der Niederbobritzscher Granit intrudierte in die Erzgebirgs-Antiklinalzone und gehört zur Gruppe der älteren Erzgebirgsgranite. Das Meißner Massiv drang in die Schiefergebirge des Elbe-Synklinoriums zwischen Riesa und Dresden ein. Nach seinem petrologisch-petrographischem Aufbau und seiner Position (Elbezone) besitzt das Massiv eine Sonderstellung als lineamenttypischer Pluton (AUTORENKOLLEKTIV, 1972). Es lassen sich mehrere, durch Differentiation bedingte Intrusivkomplexe und -phasen unterscheiden, wobei die ältesten Intrusionen in den äußeren Bereichen basischer als die jüngeren zentralen Teile sind. Die wichtigsten am Aufbau des Massivs beteiligten Magmatite sind Biotitgranodiorit, Biotit-Hornblendegranodiorit, Augit-Syenodiorit ("Gröbait"), Monzonit (Typ Plauenscher Grund) und der glimmerarme

Riesensteingranit .

1.4. Molassestockwerk

1.4.1. Oberkarbonischer Vulkanismus

Nach einer erheblichen und relativ kurzen Abtragungsphase prägte sich im Oberkarbon (Stefan) mit dem Übergang des Orogens zum Molassestadium ein intensiver subsequenter Magmatismus heraus (PÄLCHEN et al., 1984). Die Hebungs- und Abtragungsintensität muß bedeutende Ausmaße besessen haben. Dem tiefgründig angeschnittenen Meißner Massiv lagern oberkarbonische (Stefan) Rhyolithergüsse auf. Den Eruptivlinien von Meißner-Teplice (TRÖGER, et al., 1969) sitzen die oberkarbonischen Vulkanitgebiete des Tharandter Waldes, des Osterzgebirges und des Raumes Meißen auf.

Der Vulkanitkomplex von Tharandt (siehe Abb. 3) besitzt etwa 50 km² Ausdehnung. Die Vulkanite "verschweißen" das Erzgebirgskristallin mit den Schieferserien des Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirges (siehe Abb. 3).

Die Magmatite des Tharandter Vulkanitkomplexes wurden bereits während der sächsischen geologischen Landeskartierung in einen älteren quarzarmen Porphyry und einen jüngeren quarzreichen Porphyry eingeteilt. Beide Vulkanitvarietäten (Rhyolithe bis Rhyodacite) unterscheiden sich nach Hauptelementanalysen nur geringfügig. Ein deutlicher Unterschied besteht nach dem Phänokristallmodus. Der quarzarme Porphyry entspricht einem Phänokalitrachyt, der jüngere

Abb. 3.2.: Stratigraphische Übersicht d. Gesteine des Tharandter Waldes

Quarzporphyr einem Phänoalkalirhyolith. Übergangstypen treten häufig auf (SCHULZE, 1963; PÄLCHEN, 1968; FIEDLER & THALHEIM, 1989). Jünger sind Ganggesteine in felsitischer bzw. granitporphyrischer Ausbildung (BENEK in BANKWITZ, BENEK, FRISCHBUTTER & TRÖGER, 1983).

Zwei Kugelpochstein-Vorkommen befinden sich bei Spechtshausen und Braunsdorf (siehe Abb. 3). Der Pochstein stellt die basisnahe glasige Ausbildung des quarzarmen Porphyrs dar und wird als Phäno-trachytglas mit rhyodacitischer Zusammensetzung angesehen (BENEK, 1980). Die Größe der in dem schwarzen Glas eingebetteten felsitartigen Kugeln schwankt zwischen 0,001 mm und 20 cm (LENTSCHIG, 1962).

Als Förderzonen der Rhyolithe sieht MOESTA (1928) eine Grunder und eine Tharandter Spalte an. Die flächenhaft ausstreichenden Rhyolithe wurden durch einen ignimbritischen Ausbruchsmechanismus gefördert (BENEK, 1980). Durch den Ignimbritausbruch entstand ein Massedefizit im Untergrund, der eine radiale Einbruchstruktur (Calderenbildung) zur Folge hatte (MOESTA, 1928; BENEK, 1980).

Mit dem Calderen-Einbruch ging die Bildung eines Radialgang-Systems einher, das im Kartenbild deutlich hervortritt (siehe Abb. 3).

1.4.2. Rotliegendes

Die variszischen Molasseablagerungen werden am NE-Rand des Tharandter Waldes durch das Rotliegende des Döhlener Beckens

vertreten. Dieser Sedimentationsraum wurde in einer der Elbezone folgenden Dehnungsstruktur angelegt (siehe Abb. 2). Das 22 km Längserstreckung und 6 km Breite besitzende Rotliegendareal weist eine autonome lithologisch-tektonische Entwicklung auf. Eine moderne Gliederung der etwa 800 m mächtigen Gesamtabfolge stellt REICHEL (1985) vor (siehe Übersicht 3). REICHEL (1985) unterscheidet vier sedimentäre Zyklen, die den ausgehaltenen Schichtgliedern entsprechen.

Jeder der vier Sedimentationszyklen setzt mit einem Konglomerat ein. Tendenziell nimmt innerhalb jedes Zyklus die Korngröße der klastischen Schüttungen ab. Der obere Abschnitt des zweiten sedimentären Zyklus zeichnet sich durch Kohleflöze und Brandschiefer aus, die seit 1540 mit Unterbrechungen abgebaut wurden. Süßwasserkalke und Brandschiefer beenden den dritten Sedimentationszyklus. Der intermediäre Porphyritvulkanismus bleibt auf den unteren Abschnitt der Gesamtabfolge (Unkersdorf-Potschappel-Schichten) beschränkt. Vulkanische Aktivitäten werden erst wieder in den obersten Bereichen der noch erhaltenen Beckenfüllung durch den Quarzporphyr am Wachtelberg dokumentiert.

Die zahlreichen Lamprophyrgänge der Fichtelgebirgisch-Erzgebirgischen Antiklinalzone, die auch im Raum Tharandt auftreten (siehe Abb. 3), sind höchstwahrscheinlich in das Rotliegende einzuordnen.

Übersicht 3: Gliederung des Rotliegenden im Döhlener Becken (nach Reichel, 1985)

Bannewitz-Hainsberg-Schichten	Obere wechselhafte Schichten (Konglomerate, Arkosen, Tonschiefer) Wachtelberg-Quarzporphyr Untere wechselhafte Schichten (Konglomerate, Arkosen, Tonschiefer) Oberes brekziöses Konglomerat Gebänderte Sandschiefer-Arkose- Schichten Unteres brekziöses Konglomerat
Niederhäslich-Schweinsdorf-Schichten	Oberer Kalkstein Schweinsdorf-Brandschiefer Unterer Kalkstein Grüngraue Schiefertone mit kohligen Lagen Große Lette und grüngraue sandige Schiefer Graues Konglomerat
Döhlen-Schichten	Kohleflöze und Brandschiefer wechsellagernd mit sandigen Schiefern Konglomerate und Arkosen
Unkersdorf-Potschappel-Schichten	Potschappel-Wilsdruff-Porphyr Unkersdorf-Tuff Hänichener Grundkonglomerat
Liegendes: SW: Erzgebirgskristallin / Zentrum: Schieferenserien des Elbe-Synklinoriums / NE: Monzonit (Meißner Massiv)	

1.5. Tafeldeckgebirge

Zechstein- und Triassedimente fehlen in der Elbe-Senke. Sie setzen erst nördlich von Lommatzsch (Raum Riesa-Meißen) ein. Ablagerungen des Lias und unteren bis mittleren Dogger sind nicht ausgebildet. Eine jurassische Sedimentation (oberer Dogger ?; Malm) ist durch Reliktvorkommen im Störungsvolumen der Lausitzer Überschiebung belegt. Vom obersten Jura bis zur Oberkreide unterlag das betrachtete Gebiet der Abtragung. Charakteristisch für diesen Zeitabschnitt ist eine tiefgründige rotlehmiige Verwitterung des älteren Untergrunds (PIETZSCH, 1913), die auf ein subtropisches bis tropisches Klima zurückzuführen ist. Ein instruktiver Aufschluß

befindet sich am Götzenbüschchen bei Ölsa (cenomane Sandsteine überlagern zersetzten Erzgebirgsgneis). Die präcenomanen Böden wurden durch NEBE (1961) beschrieben.

1.5.1. Oberkreide

Die inselartig erhaltenen Oberkreiderelikte im Tharandter Wald sind Bestandteile der Elbtalkreide, die in das Cenoman bis Coniac einzustufen ist. Im Raum Tharandt sind lediglich Sedimente des Cenomans erhalten geblieben. Die präcenomane Landoberfläche unterlag einer tiefgreifenden Verwitterung (präcenomane Verwitterung, siehe Abschn. 4.1.)

Die Gliederung der auf engem Raum stark faziell wechselhaften Elbtalkreide geht auf Arbeiten von PIETZSCH (1916), LAMPRECHT (1934), HÄNTZSCHEL (1934), SEIFERT (1955), TRÖGER (1969), MIBUS (1975) und PRESCHER (1957, 1981) zurück. Eine zusammenfassende Darstellung der kretazischen Sedimente gibt TRÖGER (1987) (siehe Abb. 4).

1.5.1.1. Niederschönaer Schichten (Alb ?; Unter- bis Mittelcenoman)

Die kretazische Sedimentation setzt mit den limnisch-fluviatil abgelagerten Niederschönaer Schichten ein. Sie wurden in zumeist NW-SE-streichenden Senken abgelagert. Die Sedimentation setzt mit den Basalschottern ein, die aus schwer verwitternden Komponenten bestehen (Quarz, Kieselschiefer, Porphyr, Amethyst, selten Gneis, Schiefer und Diabas). Die Schotter verzahnen sich mit Linsen

feinsandigen Schluffsteinen (Plänersandstein) überlagert werden. Die Abfolge ist am Harthe-Berg des Tharandter Waldes abgeschlossen. Jüngere kretazische Schichten sind hier bereits wieder abgetragen worden.

1.5.2. Tertiär

Das sedimentäre Tertiär wird im Tharandter Wald lediglich durch ein winziges Oligozän-Vorkommen repräsentiert, das durch einen kleinen überlagernden Basaltdeckenrest westlich des Landberges vor der Abtragung geschützt wurde. Der weiße Quarzsand führt Kieselschieferfragmente und Tertiärquarzite (SAUER, 1886). Die Datierung als Oligozän beruht auf Analogieschlüssen. Eine direkte Auflagerung des Sediments auf Plänersandstein (Plenus-Zone) läßt auf alttertiäre Abtragungen schließen.

Im Tharandter Wald treten drei kleinere Basaltvorkommen auf (Ascherhübel, Landberg und ein kleines Vorkommen westlich des Landberges - siehe Abb. 3). Möglicherweise handelt es sich um Reste einer geschlossenen Basaltdecke, wobei das Eruptionszentrum in der Quellkuppe des Ascherhübels zu sehen ist.

Der Basalteruption ging die Förderung von Basalttöffen, Bomben und Lapillis voraus, die am Nordwesthang des Landberges austreichen. Den roten bis braunen Basalttöffen sind Sandstein- und Schieferfetzen eingelagert.

Der Basalt des Tharandter Waldes wurde von LENTSCHIG (1962) als Nephelinbasalt charakterisiert. Am Ascherhübel führt das Gestein

zahlreiche Xenolithe des durchschlagenen Untergrundes (Sandsteine, Porphyre). Der kretazische Sandstein im Liegenden der Basaltdecke wurde durch die thermische Beanspruchung gefrittet.

Nachdem während des Rotliegenden die Entwicklung des variszischen Orogens einen quasikratonen Zustand erreicht hatte, begann das durch die germanotype Tektonik charakterisierte Tafelstadium. Die Störungen der Folgezeit führten zunächst nicht zu Magmenmobilisationen. Erst im Tertiär lösten Tiefenstörungen im Zusammenhang mit der Herausbildung des Nordböhmischen Tertiärgrabens (Ohre-Rift) auch den basischen Magmatismus in Sachsen aus (PFEIFFER, 1975). Die Aktivitäten des Tertiärvulkanismus waren vorrangig an Kreuzungspunkte von NE-SW- und NW-SE- Störungen gebunden.

Der Vulkanismus begann im oberen Eozän mit Olivinnepheliniten und setzte sich nach einer Stagnation im unteren und mittleren Oligozän fort, um im Miozän sein Maximum zu erreichen (PFEIFFER, 1975), dem auch das Basaltvorkommen des Tharandter Waldes zuzuordnen ist.

Insbesondere auf dem Plänersandstein treten Relikte einer tiefgreifenden tertiären Verwitterungsdecke (sog. "Braunlehm") auf (siehe Abschn. 7).

1.5.3. Quartär

Die pleistozäne Elster-Vereisung erreichte zumindest randlich den Tharandter Wald. Die Feuersteinlinie verläuft über Nossen,

Wilsdruff, die Großpitzer Höhe, den Bahnhof Tharandt und weiter nach Somsdorf. Die folgenden Glazialzeiten tangierten den Tharandter Wald nicht direkt, führten jedoch zu einer verbreiteten Lösssedimentation, dessen Derivate als Lößlehm und Gehängelehm in der pleistozänen Deckschichten auftreten (siehe Abschn. 7).

Die Anlage pleistozäner Schotterterrassen ist in den tief eingeschnittenen Tälern im Tharandter Wald und seines Rahmens verbreitet.

2. Standortverhältnisse des Tharandter Waldes

2.1. Lage und Landschaftscharakter

Der knapp 6 000 ha große Waldkomplex liegt etwa 15 km südwestlich von Dresden zwischen 50° 55' und 51° nördlicher Breite sowie 13° 25' und 13° 35' östlicher Länge am Nordrand des Osterzgebirges im Übergangsbereich vom Hügelland zum Mittelgebirge. Das Forstamt Tharandt gehört verwaltungsmäßig zum Kreis Freital und wird dem forstlichen Wuchsgebiet "Nordabdachung des Erzgebirges" zugerechnet (s. Abb. 5 und Abb. 6).

2.2. Klima

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des "Mitteldeutschen Berg- und Hügellandklimas" und weist einen mittleren jährlichen

Niederschlag von ca. 800 mm und eine Jahresdurchschnittstemperatur von 7,2° C auf (s. Abb. 7).

Nach den Unterlagen der forstlichen Standortskartierung wird der Tharandter Wald den unteren Berglagen mit feuchten Klimaverhältnissen (Uf) zugerechnet (Erläuterungsband 1965).

2.3. Bodensubstrate

Das Gebiet des Tharandter Waldes stellt geologisch keine Einheit dar. Der größte Teil gehört zum Osterzgebirge, das aus jungproterozoischem Grauen Freiburger Gneis besteht, dem permosilesische Vulkanite diskordant aufgelagert sind (Fiedler u. Thalheim, 1988).

Sie werden ihrerseits von kretazischen Sedimenten, tertiären Basalten und quartären Ablagerungen bedeckt (Linnemann u. Fiedler, 1991).

Der Freiburger Graue Gneis besteht aus normalem Biotitgneis. Die Gesteine des Tharandter Vulkanitkomplexes werden in einen älteren quarzarmen Quarzporphyr (Rhyolith) und einen jüngeren normalen Quarzporphyr (Rhyolith) eingeteilt.

In der Unterkreide erfolgte unter tropischem oder subtropischem Klima eine intensive Verwitterung der alten Landoberfläche. Reste dieser fossilen Verwitterung können in den pleistozänen Schuttdecken eingearbeitet sein und deren Eigenschaften verändern (s. Profil Kannhenkelweg). Bis zur Oberkreide war der Tharandter Wald

Abb. 5: Wuchsgebiete von Sachsen (n. VATER, KRAUSS, 1928)

Abb. 6: Lage des Exkursionsgebietes

Klimadiagramm der Station Wildacker im Tharandter Wald
(Inst. f. Hydrologie und Meteorologie der TU Dresden)

Abb. 7:

im wesentlichen Abtragungsgebiet.

Die oberkretazischen Erosionsrelikte zwischen Tharandt und Freiberg sind westliche Ausläufer der Elbtalkreide. An der Wende Alb/Cenoman wurden die limnisch-fluviatilen "Niederschöner Schichten" abgelagert. Nach der marinen Transgression im Obercenoman kam es zur Ablagerung des Unterquadersandsteins, des Penricher Sandsteins und des Plänersandsteins.

Zu Beginn des Tertiärs war der sächsische Raum wiederum Festland. Der Vulkanismus setzte wahrscheinlich im oberen Eozän ein und erreichte im unteren und mittleren Miozän ein Maximum. Im Paläogen liefen an der Landoberfläche unter subtropischen Klimaverhältnissen intensive Bodenbildungsprozesse ab (präoligozän bis prämiozän), deren Reste in Form von Braunlehm in einigen Profilen noch heute anzutreffen sind (s. Profil 7).

Das Gebiet des Tharandter Waldes blieb auch während der größten Ausdehnung des Inlandeises eisfrei. Der südliche Eisrand der Elsterkaltzeit zieht sich nördlich des Tharandter Waldes entlang. Im Vorland des Erzgebirges bildete sich ein Lößgürtel aus. Frostwechselklima führte im Periglazialbereich zu Verlagerungsvorgängen. Es entwickelten sich Schuttdecken, die auf den Hochflächen des Tharandter Waldes in Basis-, Mittel- und Deckschutt gegliedert sind.

2.4. Vegetationsverhältnisse

Der Tharandter Wald wird heute zum größten Teil von Rein- und

Mischbeständen der Baumarten Fichte und Kiefer bestockt. Nur an den Steilhängen der Kerbtäler sind noch naturnahe Laubmischwälder der Baumarten Buche, Eiche, Hainbuche, Esche, Ahorn und Ruster anzutreffen (Baronius et al. 1989).

Der regional herrschende Traubeneichen-Buchenwald (Melampyro-Fagetum) auf den Hochflächen ist zum Elbtal hin mit collinen Gesellschaften (Galio-Carpinetum, Cytiso-Quercetum) assoziiert, die höheren Teile weisen bereits submontane Verhältnisse auf (Luzulo-Fagetum).

2.5. Böden

Auf den Verebnungen des Tharandter Waldes vollzieht sich die rezente Bodenentwicklung vorwiegend in der pleistozänen Schichtenabfolge: Mittelschutt über Basisschutt. In Abhängigkeit vom Relief haben sich auf sickerwasserbeeinflussten Standorten Podsol-Braunerden und Braunerden, auf stauwasserbeeinflussten Standorten Pseudogleye und Stagnogleye herausgebildet. An Oberhangkanten treten kleinflächig die Schichtenabfolgen Deckschutt-Mittelschutt-Basisschutt oder Deckschutt-Basisschutt auf. Unter diesen Bedingungen hat die Bodenentwicklung zu den Bodentypen Braunerde-Podsol bzw. Podsol geführt (Fiedler et al. 1978). Bezüglich einer eingehenderen mineralogischen und chemischen Charakterisierung der Böden des Tharandter Waldes und Osterzgebirges sei auf Thalheim 1988, Fiedler und Thalheim (1988), Baldauf (1991) sowie Fiedler et al. (1990) verwiesen.

3. Exkursion Teil I: Präcenomane Verwitterung, Cenomantransgression, tertiäre Verwitterung und pleistozäne Deckschichten (Freitag, 13.5.94)

3.1. Cenomantransgression über der präcenomanen Landoberfläche

3.1.1. Aussichtspunkt am Hohen Stein bei Dresden-Plauen auf den Ratssteinbruch im Plauenschen Grund

Der erste Aufschluß zeigt die Sedimente der weltweit nachgewiesenen Cenomantransgression, die im Raum Dresden die präcenomane Landoberfläche bedeckt und konserviert haben. Am der Aussichtsplattform gegenüberliegenden Talhang der Weißeritz ist im Ratssteinbruch die Auflagerung cenomaner Sedimente (Pläner) über dem varizischen Monzonit (Oberkarbon) des Meißner Massivs aufgeschlossen. Über dem stark verwitterten Monzonit (präcenomaner Saprolith) gliedert sich das nahezu unzugängliche Kreideprofil nach TRÖGER (1955) folgendermaßen:

Im Liegenden tritt ein Monzonitkonglomerat mit glaukonitführenden Bindemittel auf, das zahlreiche Fossilien enthält (Muscheln, Korallen, Austern, Rudisten und Schnecken). Darüber folgt ein unreiner Kalk mit reichlich Muschelschill. Im Hangenden folgen bankige Pläner, die neben weiteren Fossilien unbestimmbare Schwämme enthalten. Weiterhin enthalten diese Gesteine Konkretionen aus amorphen Kieselgesteinen (Chert). Den Abschluß

des Profils bilden mergelige Pläner. Die Schichtenfolge fällt mit 5 bis 7° nach NE ein.

Die Bezeichnung "Pläner" soll aus der "sächsischen Verzerrung" des Begriffs "Plauener Stein" --> "Plauener" --> "Pläner" entstanden sein. Lithologisch versteht man unter Pläner ein plattig brechendes, festes, blaugraues, dichtes oder äußerst feinkörniges Sedimentgestein aus kleinsten Quarzkörnchen mit kalkigem Bindemittel (PIETZSCH, 1934).

Die Gliederung der Kreide im Raum Meißen-Dresden-Bad Schandau ist aus Abb. 4 ersichtlich.

3.1.2. Hoher Stein bei Dresden-Plauen

Foto 4

Aus dem Kreidemeer ragten auch nach der Cenomantransgression auf Schwellen und Untiefen Felsen und Klippen hervor, da das Kreidemeer eine stark gegliederte Landoberfläche geflutet hat. Um diese Klippen sind die Cenomansedimente in der sog. Klippenfazies ausgebildet (siehe Abb. 4). Unter dem Einfluß der Brandung wurden an diesen Klippen (im Falle des Hohen Steins handelt es sich um oberkarbonischen Monzonit) durch die Brandung kesselartige Vertiefungen ausgekolkt. In diesen Taschen wurden mergelige Kalke abgelagert. Am Boden der Sedimenttasche am Hohen Stein befinden sich Monzonit- und Quarzgerölle (siehe Abb. 8). Mit Hilfe des Fossilinhalts wurde die Sedimentfüllung am vorliegenden Aufschluß in die Plenus-Zone des Obercenomans eingestuft. An Fossilien treten neben Schnecken sessile

Syenitklippe des Hohen Steins bei Plauen (Frohbergs Burg) mit Klippenfazies der Labiatusstufe. (Nach H. B. GEINITZ.)
a = Syenit, b = Klippenpläner.

Abb. 8: Historische Darstellung des Hohen Steins bei Dresden-Plauen (aus der Meßtischblattbeschreibung des Blattes Dresden von H. EBERT, R. GRAHMANN & K. PIETZSCH, 3. Auflage, 1934)
(Anmerkung: Der Syenit (a) des Plauenschen Grundes wurde von L. PFEIFFER als Monzonit umbestimmt)

Tiergruppen, wie Schwämme, Brachiopoden, Austern, Rudisten und Stockkorallen auf. In Bruchschill-Lagen (Muschel- und Schneckengehäuse-Trümmer) treten in den oberen Partien auch Haifischzähne auf.

3.2. Präcenomane Verwitterung

3.2.1. Steinbruch am Götzenbüschchen bei Ölsa

Der Aufschluß am Götzenbüschchen gilt als Typuslokalität für die präcenomane Verwitterung. Aufgeschlossen rotverwitterter Gneiszersatz, der von Cenoman-Sedimenten bedeckt wird (siehe Abb. 9).

Die Sandsteine und Konglomerate gehören zum Unterquadersandstein (Cenoman). Die transgressiv auflagernden Siliciklastika sind zyklisch aufgebaut. Im unteren Teil lassen sich leicht vier Rhythmen aushalten, die jeweils mit einer Konglomerat beginnen. Zum Top jeder Bank hin nimmt die Korngröße bis zur Grob- und Feinsandfraktion ab (siehe Abb. 9). Es folgt zum Hangenden eine etwa 1 m mächtige Lage aus einem konglomeratischen Sandstein mit Grobkiesgeröllen. Den Abschluß der aufgeschlossenen Schichtenfolge bilden zwei Bänke aus feinkiesigen Konglomeraten mit Schrägschichtung. Die Sandsteinlagen enthalten Steinkerne der Muschel *Inoceramus pictus* Sow.. Insgesamt dokumentiert der Aufschluß ein eindeutiges Transgressions-Profil. Die Gerölle der Konglomerate bestehen überwiegend aus Milchquarzen. Gneis- und Porphyngerölle treten stark zurück. Es handelt sich vermutlich

Abb. 9: Auflagerung der cenomanen Siliciklastika auf das präcenomane Verwitterungsprofil am Götzenbüschchen

- 1 - rotvioletter sapolithischer Gneis; 2 - gebleichter, kaolinitreicher, z.T. destruiertes Sapolith, 3 - Konglomerat und konglomeratischer Sandstein, 4 - konglomeratischer Sandstein mit Grobkiesgeröllen, 5 - fein- bis mittelkiesiges Konglomerat

	Gneiss (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)
SiO ₂	71,41	58,2	62,98	60,14	62,30	64,35	64,28
TiO ₂	0,63	n.dtm	0,75	0,91	0,95	1,02	0,99
Al ₂ O ₃	12,00	19,8	19,57	20,02	19,95	23,40	23,96
Fe ₂ O ₃	4,58	10,7	7,98	7,72	5,85	1,21	1,05
Mn ₃ O ₄	0,15	-	-	-	-	-	-
CaO	1,15	0,3	0,35	0,90	0,55		
MgO	2,41	1,0	0,45	0,51	0,46	0,29	0,27
K ₂ O	2,82	0,9	0,30	0,46	0,52	0,56	0,56
Na ₂ O	3,05	0,1		0,05	0,07	0,20	0,09
P ₂ O ₅	0,50		0,30	0,45	0,45	0,35	0,27
SO ₃	-	-		0,10	0,10		
H ₂ O	0,97	7,4	7,32	7,96	7,58	8,40	8,62
F	0,05	0,6	0,54	0,61	0,77	0,57	0,46
kaol.	-	45-50	45-50	50	50	60	60
muscov.	-	10	5	5	5	5	5
biot.	-	-	-	-	-	-	-
quartz		30	35	50	50	50	50
orth.		+	+	-	-	-	-
plag.		-	-	-	-	-	-
haem.		8	7	7	6	1	1

Abb. 10: Geochemische und tonmineralogische Analysen des Verwitterungsprofils am Götzenbüschchen (chemische Analysen aus BLANCK & MELVILLE, 1940/41; tonmineralogische Analysen aus STÖRR & RUCHHOLZ, 1975)

um aufgearbeitete Grundschotter der fluviatilen Niederschönaer Schichten (älteste Kreideablagerungen im Raum Dresden/siehe Abb. 4).

Die Auflagerung der Cenomansedimente beweist die Einstufung der Verwitterungskruste in das Prä-Cenoman. Erstmals erkannte PIETZSCH (1913) den rotgefärbten Gneiszersatz als durch die Kreidesedimente konservierte Verwitterungskruste. Es handelt sich um kein komplettes Verwitterungsprofil, da das transkredierende Kreidemeer die Verwitterungskruste gekappt und aufgearbeitet hatte. Die Tonminerale wurden ausgeschlämmt und in tiefere Beckenbereiche umgelagert.

Als sicher gilt, das das Erzgebirge in der Unterkreide, also über 40 Mill. Jahre, Landoberfläche war. Es ist jedoch auch sehr wahrscheinlich, daß dies auch während des Jura und der Trias der Fall war.

BLANCK & MELVILLE (1940/41) bearbeiteten das Verwitterungsprofil am Götzenbüschchen geochemisch. STRÖRR & RUCHHOLZ (1975) stellen eine tonmineralogische Bearbeitung vor. Die wesentlichsten Resultate sind aus Abb. 10 ersichtlich.

Vom Liegenden zum Top des Verwitterungsprofils fällt die Abnahme von SiO₂ und die Zunahme von Al₂O₃ auf. Kaolinit tritt als neugebildetes Tonmineral auf, das nach STÖRR & RUCHHOLZ (1975) eine deutlich pseudo-hexagonale Morphologie aufweist. Die Feldspäte und Biotite im saprolithischen Gneis sind komplett kaolinitisiert.

Abb. 11: An Spalten orientierter präcenoman gebildeter Saprolith aus Quarzporphyr (Glasbruch bei Hartha)

1 - saprolithischer Quarzporphyr, 2 - durch Limonit braun gefärbter saprolithischer Quarzporphyr, 3 - roter Saprolith, 4 - grüner Saprolith, 5 - grüner Saprolith als noch relativ massive Kruste um kugelige Relikte saprolithischen Porphyrs

3.2.2. Rotlehmprofil am Kannhenkelweg

Wenige Meter unterhalb des ausstreichenden Cenomans am Markgrafenstein (Abt. Dorfhain/Tharadter Wald) liegt auf präcenoman verwittertem Gneis ein Rotlehmprofil unter einer reihenweisen Mischbestockung von Kiefer mit unterdrückter Fichte und einzelnen Birken. Als Bodenflora tritt *Aira flexuosa* (80%) und *Calamagrostis arundinacea* (10 %) beherrschend auf. Das Profil zeigt durch die präcenomane Verwitterung gebildete Rotlehme, die im Pleistozän verlagert und in die Deckschichten eingearbeitet wurden.

3.2.3. Präcenomane Verwitterung im Quarzporphyr des Glasbruchs bei Hartha

Im Glasbruch bei Hartha wurde ein oberkarbonischer Quarzporphyr (jüngerer Quarzporphyr des Tharandter Waldes) abgebaut. An tiefreichenden Spalten wurde das Gestein durch die präcenomane Verwitterung zersetzt, wobei die an den Spalten orientierten Saprolithe deutlich zonar aufgebaut sind (siehe Abb. 11).

3.4. Catena S - Berg (tertiäre Verwitterung, quartäre Deckschichten, verlagerte präcenomane und tertiäre Verwitterungsbildungen)

Die Catena S - Berg (Tharandter Wald) ist in einem Gebiet

Linnemann '91

- 47 -

angelegt worden, in dem das Substrat auf kürzester Distanz wechselt (siehe Abb. 12). Dies ermöglicht ein instruktives Studium der differenzierten Ausbildung der periglazialen Deckschichten. Die Lage der vorgestellten Profile im geologischen Profil ist aus Abb. 12 ersichtlich.

Profil 1:

Lage: Revier Tharandt, Abt. 233 b⁷, 355 m NN
 Geologie: Freiburger Grauer Gneis
 Relief: Übergang von der Hochfläche zum Steilhang des Tiefen Grundes, Hangneigung 8° nach SO
 Vegetation: Fichten-Buchen-Mischbestand; Melampyro-Fagetum
 Humusform: rohhumusartiger Moder

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrichrept
 FAO: Spodic-Dystric Cambisol
 DBG: Sauerbraunerde, Podsol-Braunerde
 Standortskartierung: Oelsengrunder Gneis-Braunerde

Abb. 12: Geologisches Profil durch die Catena S - Berg im Tharandter Wald; 1 - Relikte der tertiären Verwitterungskruste (Braunlehm); 2 - Plänersandstein (Oberkreide); 3 - Pennricher Sandstein (Oberkreide); 4 - Unterquader-Sandstein (Oberkreide); 5 - Niederschönaer Schichten (Alb/Cenoman)(Tone mit Sandsteinlinsen); 6 - Grundsotter der Niederschönaer Schichten (Alb/Cenoman); 7 präcenomane Verwitterungskruste; 8 - Quarzporphyr; 9 - Gneis; 10 - mächtiger Lößlehm

Profilbeschreibung

- O 6 -0 cm; Auflagehumus
- I Aeh 0 -8/12 cm; dunkelgraubrauner (10 YR 4/2), mäßig humoser, sehr schwach steiniger, schwach grusiger, sandiger Lehm; Kohärentgefüge; mittlere Durchwurzelung; deutlich welliger Übergang zum Bv1-Horizont
- Bv1 8/12 -30 cm; hell gelbbrauner (10 YR 6/4), sehr schwach steiniger, schwach grusiger, sandiger Lehm; Kohärentgefüge; mittlere bis schwache Durchwurzelung; diffuser Übergang zum Bv2-Horizont
- Bv2 30 -55 cm; hell gelbbrauner (10 YR 6/4), bis sehr hellbrauner (10 7/4), schwach steiniger, mäßig grusiger, sandiger Lehm; schwach durchwurzelt; diffuser Übergang zum Bv3-Horizont
- II Bv3 55 -70/80 cm; hellbrauner (10 YR 6/3), mäßig steiniger und grusiger Schlufflehm, teilweise rot-lehmig Verwittertes eingearbeitet; schwach durchwurzelt; welliger Übergang zur Schicht III
- III1 70/80-142 cm; hellbrauner (10 YR 6/3) bis hell gelbbrauner (10 YR 6/4), stark steiniger,

- stark grusiger, lehmiger Sand (feinsandig)
- III2 142 -175 cm; hellbrauner (10 YR 6/3) bis hell gelbbrauner (10 YR 6/4), stark steiniger, stark grusiger, lehmiger Sand (grobsandig)
- III3 175 -205 cm; hellbrauner (10 YR 6/3) bis hell gelbbrauner (10 YR 6/4), stark steiniger, stark grusiger, sandiger Lehm (feinsandig)
- III4 205 und tiefer braun bis gelbbrauner (10 YR 5/3 - 5/4), stark steiniger, stark grusiger, sandiger Lehm (grobsandig).

Analysenergebnisse

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Korngrößenverteilung (M.-%)							
	T	fU	mU	gU	fS	mS	gS	
Aeh 0- 5	10,8	6,4	19,1	20,6	14,4	12,2	16,5	
Bv1 12- 20	12,2	7,9	18,4	22,0	13,5	11,1	14,9	
Bv2 35- 50	9,5	7,1	14,7	27,4	12,0	9,7	19,6	
Bv3 60- 80	20,3	6,7	18,3	39,1	4,5	3,6	7,5	
III1 120-140	2,7	2,3	7,8	11,4	29,9	23,6	22,3	
III2 145-170	6,9	1,2	6,6	14,3	21,8	17,9	31,3	
III3 180-200	9,0	6,5	5,9	18,0	23,4	16,8	20,4	
III4 210-240	9,8	4,4	7,9	13,1	14,1	16,9	33,8	

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Chemische Kennwerte							
	pH (H ₂ O)	pH (KCl)	C (%)	N (%)	C/N	Fe _d (g/kg)	Fe _o	Fe _o /Fe _d
Of	4.0	3.4	43,88	1,81	24			
Oh	3.5	2.9	44,32	1,52	29			
Aeh 0- 5	3.6	2.7	4,91	0,12	41	8,2	2,60	0,32
Bv1 12-20	3.8	3.3	1,72	0,05	34	11,4	2,71	0,24
Bv2 35-50	4.1	3.9	0,21	0,02	10	10,9	0,86	0,08
Bv3 60-80	3.9	3.6				10,1	1,77	0,17
III1 120-40	4.2	3.7				26,2	0,55	0,02
III2 145-70	4.4	3.7				21,5	0,73	0,03
III3 180-00	4.4	3.6				32,8	1,19	0,04
III4 210-40	4.4	3.5				35,3	2,02	0,06

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Sorptionswerte			
	S (mval/100g)	H	T	V (%)
Of	37,8	87,3	125,1	30
Oh	26,3	100,3	126,6	21
Aeh 0- 5	7,6	20,4	28,0	27
Bv1 12- 20	3,8	15,9	19,6	19
Bv2 35- 50	4,5	6,3	10,8	42
Bv3 60- 80	8,6	11,1	19,7	44
III1 120-140	6,0	4,9	10,9	55
III2 145-170	7,5	5,5	13,0	58
III3 180-200	11,2	7,2	18,4	61
III4 210-240	14,8	10,1	24,9	59

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte (%)									
	P	K	Ca	Mg	Fe	Al	Ti	Na	S	Mn
Of	0,13	0,24	0,50	0,09	1,08	1,02	0,11	0,13	0,37	0,08
Oh	0,09	0,32	0,20	0,05	0,89	1,20	0,11	0,18	0,29	0,01
Aeh 0- 5	0,03	1,88	0,15	0,09	1,12	4,37	0,30	0,98	0,04	0,01
Bv1 12- 20	0,03	2,29	0,18	0,15	1,76	5,98	0,37	1,11	0,02	0,03
Bv2 35- 50	0,03	2,66	0,17	0,22	1,94	6,47	0,34	1,18	0,03	0,02
Bv3 60- 80	0,03	1,80	0,18	0,45	2,57	5,74	0,43	0,70	0,02	0,03
C1 120-140	0,07	3,27	0,20	0,16	3,78	7,68	0,28	2,04	0,01	0,06
C2 145-170	0,06	3,46	0,20	0,22	3,20	7,44	0,30	1,75	0,02	0,04
C3 180-200	0,08	3,28	0,13	0,53	5,07	9,37	0,48	1,13	0,02	0,12
C4 210-240	0,11	3,40	0,08	0,81	6,97	9,29	0,91	0,45	0,03	0,22

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte (ppm)				
	Ba	Cu	Sr	V	Zn
Of	259	22	47	24	135
Oh	193	18	33	20	90
Aeh 0- 5	504	10	48	19	34
Bv1 12- 20	616	14	62	24	76
Bv2 35- 50	628	19	62	26	70
Bv3 60- 80	459	16	76	54	52
C1 120-140	572	26	47	14	113
C2 145-170	569	22	54	20	106
C3 180-200	437	42	34	44	174
C4 210-240	494	50	26	89	248

Interpretation

Das tiefgründige Profil über Grauem Gneis ist nach der Korngrößenzusammensetzung zweigegliedert. Im oberen Teil (7-8 dm) ist der Grobschluff Hauptkorngrößenfraktion, im unteren Teil (17-18 dm) dominieren die Sandfraktionen im Feinboden. Die Einordnung beider Substrate in das pleistozäne Schichtpaket ist in dieser Reliefposition mit Unsicherheiten behaftet, entspricht vom Liegenden zum Hangenden jedoch weitgehend der Abfolge Basissediment-Zwischensediment-Mittelsediment.

Das Basissediment ist ein sandiger, stark steiniger Gneis-Schutt. Der vertikale Wechsel in der Hauptkorngrößenfraktion zwischen Fein- und Grobsand erlaubt eine Differenzierung in Teilschichten und deutet auf unterschiedliche Sedimentationsbedingungen während der Ablagerung hin.

Das Mittelsediment (Körnungsart: sandiger Lehm) ist wesentlich skelettärmer und weist mit Grobschluffgehalten über 20 M.-% einen deutlichen äolischen Einfluß auf.

Basissediment und Mittelsediment werden durch ein Zwischensediment von etwa 2-3 dm Mächtigkeit getrennt, das teilweise rot-lehmiges Verwitterungsmaterial enthält.

Die Bestockungsverhältnisse am Profil vermitteln Hinweise auf die ursprüngliche Vegetation. Unter dem Fichten-Buchen-Mischbestand sind in der Bodenvegetation die Florenelemente des artenarmen bodensauren Traubeneichen-Buchenwaldes (Melampyro-Fagetum), wie Luzula albida (Schmalblättrige Hainsimse) und Deschampsia flexuosa (Drahtschmiele), vertreten.

Profil 2

Lage: Revier Tharandt, Abt. 236 a², 370 m NN

Geologie: Rhyolith (quarzarmer Quarzporphyr)

Relief: flache Mulde

Vegetation: Fichtenbestand; Melampyro-Fagetum

Humusform: Rohhumus

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrochrept

FAO: Spodic-Dystric Cambisol

DBG: Podsol-Braunerde

Standortskartierung: Naundorfer Porphyr Braunerde

Profilbeschreibung

O 3 - 0 cm; Auflagehumus

I Aeh 0 - 10 cm; grauer bis braubrauner (10 YR 5/1-5/2), humoser, lehmig-schluffiger Skelettboden; locker diffuser Übergang zum AeBv-Horizont

AeBv 10 - 20 cm; hellbrauner (10 YR 6/3), lehmig-schluffiger Skelettboden diffuser Übergang zum Bv1-Horizont

Bv1 20 - 45/50 cm; Hellbrauner bis gelbbrauner (10 YR (/3-6/4), lehmig-schluffiger

Skelettboden, deutliche Grenze zum
Bv2-Horizont

Bv2 45/50-70/80 cm; sehr blaß brauner (10 YR 7/3-8/3),
lehmig-sandiger Skelettboden, sehr
deutlicher Übergang zur Schicht II

II 70/80 und weißer (10 YR 8/2), lehmig-schluffiger
tiefer Skelettboden; extrem fest

Analysenergebnisse

Mittlere Korngrößenzusammensetzung des Feinbodens von 4 Profilen
(in Masse-%)

	T	fU	mU	gU	fS	mS	gS
Mittelsediment	13,7	9,6	22,1	22,1	7,1	9,3	16,1
Basissediment	10,2	7,2	16,8	14,1	7,0	10,5	34,2
Graulehm	18,2	19,5	27,2	21,2	4,6	4,6	4,9

Gesamt-Elementgehalt des Feinbodens

	P	K	Ca	Mg	Fe	Al	Ti	Na	S(%)
Mittel- sediment	0,03	2,58	0,12	0,18	1,43	5,08	0,35	0,46	0,046
Basis- sediment	0,01	3,42	0,08	0,21	1,37	7,44	0,26	0,31	0,018

	Ba	Cu	Sr	Ni	V	Cr	Zn	Co	Mn(ppm)
Mittel- sediment	318	4	48	8	28	70	55	6	190

Das lehmig-schluffige Mittelsediment weist im Vergleich zum
lehmig-sandigen Basissediment bei Ca, Ti, Na, S, Ba, Sr, Cr, Ni
und Zn höhere Gesamt-Elementgehalte auf, das Basissediment ist
K-, Mg-, Mn- und Al-reicher.

Froststrukturböden

Das Mikrorelief gliedert sich in die Formenelemente Hügel, Mulde
und die flächenmäßig dominierenden Zwischenformen. Auf diese
Formen verteilt sich die Bestandeskreisfläche wie folgt Zustand
1984):

	G(m ² /ha)	relativ	Dg 1,3 (cm)
Hügel	4,3	13 %	31,3
Zwischenform	29,1	87 %	27,9
Mulde	0,2	1 %	24,2
	33,6	100 %	

Die Bäume stocken nicht in den Relief-Hohlformen. Eine
bodenkundliche Untersuchung muß sich auf die Voll- und vor allem
Zwischenformen konzentrieren, wenn Beziehungen zum Wachstum
gesucht werden.

Mineralogische Zusammensetzung

Schicht	Hori- zont	Tiefe(cm)	Minerale (Fraktion 0,063-0,02 mm, M-%)							
			O	F	G	H	O	R	O/F	
I	(DS) A _{he}	0-5(12)								
II	(MS) B _v	5(12)-30(60)	15,45	4,88	0,60	0,43	0,21	2,32	3,17	
III ₁	(BS)	30(60)-100								
III ₂	(BS)	100-125(130)								
IV	(BS)	125(130)-205	12,30	4,75	1,45	0,25	0,09	2,36	2,59	

Das Skelett des Deck-, Mittel- und Basissediments besteht aus Rhyolith.

Im Feinboden des Mittelsediments treten neben idiomorphem und hypidiomorphem Hochquarz mit homogener Auslöschung aus dem Rhyolith unregelmäßig geformte Quarze mit homogener und undulöser Auslöschung sowie Kataklase und gut gerundete bis gerundete mattierte äolische Quarze auf. An Feldspäten sind Orthoklas, Albit sowie Oligoklas bis Andesin mit Verwitterungserscheinungen zu beobachten. Im Grobschluff treten vereinzelt Mikroklin und Perthit auf. Die Glimmeranteile bestehen aus Hell- und Dunkelglimmer. An Gesteinsbruchstücken sind Rhyolith mit wenigen Quarz- und Feldspateinsprenglingen zu beobachten.

Im älteren Basissediment sind neben idiomorphem bis hypidiomorphem Hochquarz und Bruchstücken mit muschligem Bruch kantengerundete bis schwach gerundete Quarze mit homogener oder

undulöser Auslöschung sowie Kataklase und vereinzelt äolische Quarze vertreten. Die Alkalifeldspäte sind angewittert bis stark zersetzt. Oligoklas/Andesin treten neben Mikroklin erst im Grob- und Mittelschluff auf. Der Glimmeranteil besteht aus Hell- und Dunkelglimmern.

Zum Rest werden zersetzte Feldspäte, Glimmer und Gesteinsbruchstücke sowie Kaolinitaggregate gezählt.

Aus der mineralogischen und granulometrischen Zusammensetzung des Feinbodens von Schicht IV ist ein äolischer Anteil in diesem Sediment abzuleiten.

In der Tonmineralzusammensetzung bestehen deutliche Unterschiede zwischen dem Mittelsediment und dem älteren Basissediment. Das Mittelsediment ist vor allem aus Vermiculit und untergeordnet aus etwas Kaolinit zusammengesetzt. Tendenzen zu sekundärer Chloritisierung sind zu beobachten.

Die Tonfraktion des älteren Basissediments ist vor allem aus Kaolinit und untergeordnet Illit zusammengesetzt. Der Kaolinit stammt in der gutkristallisierten Form aus einer fossilen Verwitterung.

Schichtung

Die mehr als 70 cm mächtige, an der Profilbasis aufgeschlossene Schicht IV besteht aus Rhyolithschutt mit einer Lößkomponente und umgelagerten Produkten einer fossilen silicatischen Verwitterung im Feinboden (schluffige Feinbodenfazies). Die Lagerung dieser

Schicht unter dem typisch ausgebildeten Basissediment, die Mächtigkeit, die Allochthonie, der Skelettgehalt und der Anteil an fossilen Verwitterungsprodukten im Feinboden deuten auf einen prä- bis frühpleistozänen Basisschutt mit einem Anteil an älterem Löß hin.

Über diesem älteren Basissediment in ein ca. 70 cm mächtiger, zweigliedriger Rhyolith-Basisschutt entwickelt, der im Gegensatz zu Liegenden lockerer gelagert ist und einen sandigen Feinboden besitzt. Das 20 cm mächtige Mittelsediment, ein lößhaltiger Rhyolith-Mittelschutt, weist einen markanten äolischen Anteil im Feinboden auf.

Im 10 cm mächtigen Decksediment, dem Rhyolith-Deckschutt, ist der Skelettgehalt höher als im Mittelsediment.

Profil 3

Lage: Revier Tharandt, Abt. 228 a, 380 m NN
Geologie: Rhyolith (quarzarmer Quarzporphyr)
Relief: Muldenrand, nach NW exponiert
Vegetation: Fichten-Bestand mit einzelnen Kiefern, Birken und Lärchen
Humusform: Rohhumus

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrachrept
FAO: Dystric Cambisol

DBG: Podsol-Braunerde
Standortskartierung: Klingenberger Porphy-Braunerde

Profilbeschreibung

O 6- 0 cm; Auflagehumus
I Aeh 0- 8 cm; dunkelgraubrauner (10 YR 4/2), mäßig humoser, mäßig grusiger, sandiger Lehm; Kohärentgefüge; mittlere Durchwurzelung; diffuser Übergang zum Bv-Horizont
Bv 8- 40 cm; hellbrauner (10 YR 7/3), mäßig grusiger, lehmiger Schluff; Kohärentgefüge; schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zur Schicht II
III1 40- 50 cm; rosaweißer (5 YR 8/2), mäßig bis stark grusiger, lehmiger Grobsand; Kohärentgefüge;
II2 50-110 cm; rosaweißer (5 YR 8/2), steiniger, sehr stark grusiger, lehmiger Sand; sehr schwach durchwurzelt
II3 110-175 cm; rosaweißer (5 YR 8/2), stark bis sehr stark grusiger, sandiger Lehm; sehr schwach durchwurzelt
II4 175-180 cm; rosafarbiger (5 YR 8/3), stark grusiger, lehmiger Sand; sehr schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zur Schicht III1

III1 180-185 cm; roter (2,5 YR 4/6), stark grusiger Rot-
lehm; deutlicher Übergang zu III2
III2 185 cm u.tiefer rosafarbiger (5 YR 7/3), lehmiger Ske-
lettboden; Rhyolithzersatz

Analysenergebnisse

Horizont/ Entnahme- tiefe (cm)	Korngrößenverteilung (M.-%)						
	T	fU	mU	gU	fS	mS	gS
Bv 10- 40	13,6	10,4	21,4	33,5	3,9	5,6	11,6
III1 40- 50	8,8	6,6	3,2	2,4	4,2	17,8	57,0
II2 50-110	8,6	8,8	4,1	4,9	6,6	15,5	51,5
II3 110-175	12,0	12,4	5,8	3,2	4,9	13,7	48,0
II4 175-180	11,0	9,0	3,8	1,9	5,6	16,2	52,5
III1 180-185	28,1	15,3	4,2	3,0	4,7	12,0	32,7
III2 185-200	21,8	11,6	3,1	2,7	5,4	15,2	40,2

Die einzelnen Schichten des Bodenprofils unterscheiden sich deutlich in der Körnungsart des Feinbodens voneinander. Der Zersatz (Schicht III) ist als Lehm (L), das Basissediment (Schicht II) als schwach lehmiger Sand (lS) bis sandiger Lehm (sL) und das Mittelsediment (Schicht I) als lehmiger Schluff (lU)

ausgebildet.

Der Zersatz ist durch ein Korngrößenmaximum im Grobsand (H: gS, 45,1-53,4 M%) und einen im Vergleich zum Basissediment höheren Tonanteil charakterisiert.

Das Basissediment weist höhere Grobsandgehalte auf (H: gS, 45,1-53,4 M%).

Zersatz und Basissediment können nach der Korngrößenzusammensetzung des Fein- und besonders des Grobbodens in Teilschichten untergliedert werden.

Das Mittelsediment besitzt ein eingipfliges Maximum in der Grobschlufffraktion (H: gU, 31,0 M%). Der Feinheitsgrad beträgt 61,9 und nähert sich den Werten für Löß und Lößderivate.

Mineralogische Zusammensetzung

Schicht/ Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Minerale (Fraktion 0,063-0,02 mm, M.- %)						
	Q	F	G	H	O	R	Q/F
I Aeh 0 - 8							
Bv 8 - 40	21,49	6,09	1,81	0,51	0,24	3,36	3,52
III1 40 - 50	0,39	0,48	0,19	0,01	0,04	1,29	0,81
II2 50 - 110	1,26	0,96	0,49	v.h.	0,08	2,11	1,31
II3 110 - 175	0,42	0,75	0,32	0,01	0,11	1,59	0,56
II4 175 - 180	0,14	0,36	0,11	0,01	0,11	1,17	0,39
III1 180 - 185	0,24	0,45	0,18	0,01	0,39	1,73	0,53
III2 185 - 200	0,24	0,58	0,18	v.h.	0,13	1,57	0,41

Das Skelett des Mittelsediments besteht vorwiegend aus Rhyolith und wenig Sandstein (Plänersandstein, Unterquadersandstein).

Das Basissediment und der Zersatz sind im Grobboden ausschließlich aus Rhyolith zusammengesetzt. Der Feinboden des Mittelsediments besteht aus idiomorphem Hochquarz, schwach gerundeten bis gerundeten Rhyolithquarzen, Quarzkörnern aus Sandstein und typisch äolischen Quarzen mit mattierter Oberfläche. Unter den Alkalifeldspäten dominieren die Kalifeldspäte. Im Grobschluff finden sich auch Plagioklas, Mikroklin und perthitische Feldspäte, die der äolischen Komponente zugeordnet werden müssen. In der Glimmergruppe treten sowohl Hell- als auch Dunkelglimmer auf. An Gesteinsbruchstücken sind Rhyolith, Plänersandstein und gröberkörniger Sandstein zu beobachten. Das Basissediment und der Zersatz weisen die Mineralassoziation des Rhyoliths auf. Hochquarz und Bruchstücke treten in gerundeter bis schwach gerundeter Form auf, besitzen homogene Auslöschung und vielfach Gas- und Mineraleinschlüsse (Rutil).

Die Kalifeldspäte sind häufig randlich kaolinisiert. Albit und Oligoklas treten nur vereinzelt in stark angewitterter Form auf. Die Kaolinisierung ist im Zersatz stärker ausgeprägt. Als Gesteinsbruchstücke tritt ausschließlich Rhyolith auf.

Die Schichten können nach der quantitativen mineralogischen Zusammensetzung differenziert werden. Das Mittelsediment ist durch höhere Quarz-, Feldspat- und Glimmergehalte einer äolischen

Komponente im Grobschluff charakterisiert.

Basissediment und Zersatz besitzen höhere Gehalte an Gesteinsbruchstücken und Feldspäten in der Mittel- und Feinsandsfraktion und geringere Quarzanteile. Das Basissediment besteht aus verlagertem rotverwittertem Rhyolith, während der Zersatz autochthon lagert.

Die Tonmineralzusammensetzung unterscheidet sich zwischen Mittel- und Basissediment. Das Mittelsediment besteht vorwiegend aus Kaolinit und Vermiculit sowie untergeordnet aus Illit-Vermiculit-Wechselagerungen und Illit. Der Kaolinitanteil stammt aus der Beimengung fossilen Verwitterungsmaterials im Mittelsediment.

Die Tonfraktionen des Basissediments als auch des Zersatzes sind vor allem aus Kaolinit einer fossilen siallitischen Rotverwitterung zusammengesetzt. Daneben tritt etwas Illit auf.

Schichtung

In diesem Profil ist im Liegenden der autochthone Rhyolithzersatz in 20 cm Mächtigkeit ausgebildet. Der autochthone Zersatz stellt ein Relikt einer mächtigeren präcenomanen siallitischen Rotverwitterung dar, deren hangende Teile erodiert sind.

Das Basissediment besteht in 140 cm Mächtigkeit aus umgelagertem Rhyolithzersatz. Hinsichtlich Skelettgehalt und Feinbodenzusammensetzung kann diese Schicht in Teilschichten untergliedert werden. Aus der Differenzierung in Teilschichten ergibt sich eine mehrphasige Entwicklung des Basissediments. Das

40 cm mächtige Mittelsediment ist skelettärmer und besteht aus Gebirgslöß. die äolische Komponente ist sowohl granulometrisch als auch mineralogisch nachgewiesen.

Horizont/ Entnahme- tiefe (cm)	Chemische Kennwerte						
	pH (H ₂ O)	C (KCl)	N (%)	C/N	Fe _a (g/kg)	Fe _o	Fe _o /Fe _a
Bv 10- 40	4.5	4.1			4,0	0,91	0,23
II1 40- 50	4.8	4.3			5,0	0,52	0,10
II2 50-110	4.9	4.3			5,2	0,17	0,03
II3 110-175	4.9	4.1			6,2	0,06	0,01
II4 175-180	4.9	-			8,2	0,09	0,01
III1 180-185	4.6	3.9			2,9	0,05	0,02
III2 185-200	-	-			5,0	0,05	0,01

Horizont/ Entnahme- tiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte (%)										
	P	K	Ca	Mg	Fe	Al	Ti	Na	S	Mn	
Bv 10- 40	0,02	2,42	0,18	0,26	1,53	4,43	0,41	0,52	0,05	0,02	
II1 40- 50	0,01	4,72	<0,02	0,13	0,84	4,81	0,16	0,11	0,03	0,01	
II2 50-110	0,01	4,90	<0,02	0,13	0,93	4,85	0,18	0,13	0,03	0,01	
II3 110-175	0,01	4,77	<0,02	0,13	1,40	5,79	0,17	0,11	<0,02	0,01	
II4 175-180	0,02	4,64	<0,02	0,12	1,71	5,46	0,13	0,08	<0,02	0,01	
III1 180-185	0,03	3,72	<0,02	0,15	4,34	5,50	0,13	0,08	0,03	0,01	
III2 185-200	0,02	3,58	<0,02	0,15	2,75	6,75	0,15	0,06	0,03	0,01	

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamtelementgehalte (ppm)				
	Ba	Cu	Sr	V	Zn
Bv 10- 40	1450	18	54	31	54
II1 40- 50	775	15	9	10	38
II2 50-110	980	57	14	10	59
II3 110-175	532	26	14	10	50
II4 175-180	203	62	12	10	66
III1 180-185	1282	33	28	28	74
III2 185-200	756	136	35	14	117

Interpretation

Profil 3 als Bodenbildung über Rhyolith ist lithostratigraphisch in Zersatz, Basissediment und Mittelsediment gegliedert.

Der autochthone Rhyolithzersatz wird 18 dm unter Flur in einer Mächtigkeit von 2-3 dm aufgeschlossen. Er ist im Feinboden als Lehm ausgebildet, der ein Korngrößenmaximum im Grobsand aufweist.

Der Zersatz ist das Relikt eines mächtigeren fossilen Verwitterungsprofils, dessen hangende Teile erodiert sind.

Das Basissediment mit einer Mächtigkeit von 14 dm besteht aus umgelagertem Rhyolithzersatz. Der Feinboden ist ein schwach lehmi-ger Sand bis sandiger Lehm. Das Basissediment weist im Vergleich zum Zersatz höhere Grobsandgehalte und geringere Tongehalte auf.

Hinsichtlich Skelettgehalt und Feinbodenzusammensetzung kann das Basissediment in Teilschichten untergliedert werden. Danach fand eine mehrphasige Entwicklung des Basissedimentes statt, wobei der fossile Zersatz durch Frostverwitterung weiter zerkleinert und umgelagert wurde. Äolische Prozesse waren nicht oder nur

untergeordnet beteiligt.

Das 40 cm mächtige Mittelsediment ist skelettarm und besteht aus Gebirgslöß. Die äolische Komponente ist sowohl granulometrisch als auch mineralogisch belegt. Das Substrat besitzt ein eingipfeliges Maximum in der Grobschlufffraktion und einen Kornsummenkurvenverlauf, wie er für einen deutlichen äolischen Anteil typisch ist (Thalheim u. Fiedler 1990). Der Feinheitsgrad beträgt 62 und nähert sich den Werten für Löß und Lößderivate.

Die Schichten können nach der quantitativen Mineralzusammensetzung differenziert werden. Das Mittelsediment ist durch höhere Quarz-, Feldspat- und Glimmergehalte einer äolischen Komponente im Grobschluff charakterisiert. Basissediment und Zersatz besitzen höhere Gehalte an Gesteinsbruchstücken und Feldspäten in der Mittel- und Feinsandfraktion sowie geringe Quarzanteile.

Auch die Tonmineralzusammensetzung unterscheidet sich zwischen Mittel- und Basissediment. Das Mittelsediment besteht vorwiegend aus Kaolinit und Vermiculit sowie untergeordnet aus Illit-Vermiculit-Wechselagerungen und Illit. Die Tonfraktionen des Basis-sedimentes und auch des Zersatzes sind vor allem aus Kaolinit zusammengesetzt, der aus einer fossilen siallitischen Rotverwitterung stammt.

Profil 4

Lage: Revier Tharandt, Abt. 229 a⁹, 385m NN

Geologie: Niederschönaer Schichten, Crednerienton

Relief: NO-Mittelhang, 7-8° geneigt

Vegetation: Mischbestand von Fichte, Birke und Kiefer; Melampyro-Fagetum

Humusform: Rohhumus

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Haplaquept

FAO: Stagno-Dystric Gleysol, Spodo-Stagnic Gleysol

DBG: Hangpseudogley, Podsol-Pseudogley

Standortskartierung: Spechtshausener Lehmsandstein-Staugley

Profilbeschreibung

O	3- 0 cm;	Auflagehumus
I Ahe	0- 10 cm;	hell graubrauner (10 YR 6/2-6/3), mäßig humoser, sehr schwach steiniger, mäßig grusiger, sandiger Lehm; Kohärentgefüge; mittlere Durchwurzelung; welliger diffuser Übergang zum Sw-Horizont
Sw	10- 35 cm;	hellgrauer (10 YR 7/2), sehr schwach steiniger, mäßig grusiger, sandiger Lehm bis lehmiger Schluff; Kohärentgefüge; schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zum Sd-Horizont
II Sd1	35- 65 cm;	rosafarbiger (7,5 YR 7/5-5YR 7/3), marmorierter, sehr schwach steiniger, mäßig grusiger Lehm; schwach durchwurzelt;

		deutlicher Übergang zum Sd2-Horizont
Sd2	65- 85 cm;	grauer (10 YR 6/1), schwach marmorierter, mäßig steinig-grusiger, sandiger Lehm; deutlicher Übergang zur Schicht III1
III1	85-130 cm;	hellgrauer (10 YR 7/2-7/1), schwach skeletthaltiger, lehmiger Ton;
III2	130-150 cm;	weißer (10 YR 8/2-8/1), grusiger Lehm
III3	150-160 cm;	grauer (10 YR 6/1), schwach skeletthaltiger, sandiger Lehm; scharfer Übergang zu III4
III4	160-190 cm;	hellgrauer (10 YR 7/2-7/1), lehmig-sandiger Skelettboden

Analysenergebnisse

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)		Korngrößenverteilung (M.-%)						
		T	fU	mU	gU	fS	mS	gS
Ahe	3- 8	7,1	5,3	21,9	19,9	30,1	11,3	4,4
Sw	15- 20	13,3	6,6	23,6	18,1	26,7	8,0	4,0
Sd1	35- 45	11,5	6,6	24,9	22,1	23,3	7,8	3,8
Sd2	50- 60	20,9	6,6	22,0	12,5	21,0	10,3	6,7
	70- 80	14,7	9,5	7,4	3,8	12,7	21,9	30,0
III1	110-120	38,4	13,4	21,4	12,0	11,4	1,8	1,6
III2	130-140	27,9	7,7	12,0	9,1	13,2	12,4	17,7
III3	150-160	18,9	7,4	12,5	9,9	43,2	7,3	0,8
III4	185-200	13,1	3,7	5,8	4,2	15,1	29,1	29,0

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)		Chemische Kennwerte						
		pH (KCl)	C (%)	N (%)	C/N	Fe _a (g/kg)	Fe _o	Fe _o /Fe _a
Of		3.1	44,10	1,93	23			
Oh		2.9	33,20	1,32	25			
Ahe	3- 8	2.7	3,00	0,10	30	5,1	4,53	0,89
Sw	15- 20	3.2				2,5	1,68	0,68
Sd1	35- 45	3.8				9,7	2,67	0,28
Sd2	50- 60	3.6				11,7	2,98	0,25
	70- 80	3.7				-	-	-
III1	110-120	3.8				0,3	0,15	0,48
III2	130-140	3.6				0,6	0,07	0,11
III3	150-160	3.8				0,9	0,09	0,10
III4	185-200	4.0				0,9	0,10	0,11

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)		Gesamt-Elementgehalte								
		P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Cu	Zn	
		(%)							(ppm)	
Of		0,10	0,06	0,31	0,07	1,17	0,01	29	164	
Oh		0,07	0,05	0,21	0,03	0,71	0,01	19	106	
Ahe	3- 8	0,02	0,89	0,10	0,09	0,89	0,01	10	21	
Sw	15- 20	0,02	1,08	0,11	0,17	1,89	0,02	10	36	
Sd1	35- 45	0,01	1,38	0,13	0,21	1,28	0,01	8	30	
Sd2	50- 60	0,01	1,45	0,09	0,32	2,27	0,01	15	40	
	70- 80	0,01	0,73	0,00	0,09	0,55	<0,01	6	18	
III1	110-120	0,01	1,34	0,01	0,21	0,92	<0,01	12	(98)	
III2	130-140	0,01	1,16	0,01	0,16	0,58	<0,01	7	27	
III3	150-160	0,02	1,45	0,01	0,17	0,68	<0,01	15	39	
III4	185-200	0,01	0,89	0,00	0,08	0,63	<0,01	8	30	

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Sorptionswerte			
	S	H	T	V
	(mval/100g)			(%)
Of	16,6	49,3	65,9	25
Oh	10,5	50,9	61,4	17
Ahe 3- 8	1,4	7,8	9,2	15
Sw 15- 20	1,4	8,9	10,3	13
Sd1 35- 45	1,4	3,2	4,6	30
Sd2 50- 60	1,6	4,6	6,2	25
70- 80	0,7	2,5	3,2	23
III1 110-120	0,4	4,3	4,7	9
III2 130-140	1,4	2,9	4,3	32
III3 150-160	1,4	5,0	6,4	22
III4 185-200	1,2	2,1	3,3	35

Interpretation

In dem 20 dm tiefen Profil ist die Schichtenfolge Zersatz-Basis-sediment-Mittelsediment.

Der nicht verlagerte (autochthone) Zersatz der Niederschönaer Schichten ist 8,5 dm unter Flur in einer Mächtigkeit von über 10 dm aufgeschlossen. Das Substrat läßt sich granulometrisch weiter differenzieren, wobei vom Liegenden zum Hangenden der faziel-le Wechsel vom groben fluviatil-äolischen Sandstein zu den pflanzenführenden Lagen der Crednerientone innerhalb der Niederschönaer Schichten gut zu beobachten ist.

Das 5 bis 6 dm mächtige Basissediment ist zweigegliedert. Der sandig-lehmige Sandstein-Basisschutt im unteren Teil ist stark vom Zersatz beeinflusst, während der obere Teil als Lehm-Basis-

fließerde vorliegt und Beimengungen von fossilem Braunlehm sowie eine äolische Komponente aufweist.

Das 3-4 dm mächtige Mittelsediment ist als Sand-Lößfließerde ausgebildet.

An dem mäßig geneigten Hang tritt Staunässe auf, die von einem Quellhorizont am Fuße der Unterquadersandstein-Steilstufe oberhalb des Profils gespeist wird. Infolge des Mikroreliefs, das durch Aufwölbungen hervorgerufen wird, die teilweise oder vollständig von Vertiefungen umgeben werden, ist der Staunäseeinfluß auf die Bodenbildung unterschiedlich stark ausgeprägt. In den Mulden haben sich Hangpseudogleye, wie im vorliegenden Profil, und in den Aufwölbungen Pseudogley-Braunerden entwickelt.

Profil 5

Lage:	Revier Tharandt, Abt. 229 a ⁹ , 405 m NN
Geologie:	Unterquadersandstein (Naviculare-Zone, Oberhäslicher Schichten)
Relief:	15° geneigte Steilstufe am NO-Oberhang des S-Berges
Vegetation:	Fichtenbestand mit einzelnen Kiefern, Birken und Buchen
Humusform:	Rohhumus
Bodenklassifikation	
Soil Taxonomy:	Typic Haplorthod
FAO:	Ferro-Orthic Podzol

DBG: Typischer Podsol, Humuseisenpodsol

Standortskartierung: Reinhardtsdorfer Sandstein-Podsol

Profilbeschreibung

- O 7- 0 cm; Auflagehumus
- I Ahe 0- 6 cm; grauer bis graubrauner (10 YR 5/1-5/2), sehr stark humoser, schwach steinig-grusiger, lehmiger Sand; mittlere Durchwurzelung; welliger Übergang zum Ae-Horizont
- Ae 6- 35 cm; hellgrauer (10 YR 7/2-7/1), schwach humoser, schwach steinig-grusiger, lehmig-schluffiger Sand; Einzelkorngefüge; schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zum Bhs-Horizont
- II Bhs 35- 40 cm; brauner bis dunkelbrauner (7,5 YR 5/4-4/4), mäßig humoser, mäßig steinig-grusiger, sandiger Lehm; Kittgefüge; deutlicher Übergang zum BC-Horizont
- BC 40- 65 cm; hellbrauner (7,5 YR 6/4), steinig-grusiger, lehmiger Sand
- III C 65 cm u. tiefer sehr hellbrauner (10 YR 7/3), sehr stark steinig-grusiger, sandiger Lehm; sehr schwach durchwurzelt

Analysenergebnisse

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Korngrößenverteilung (M.-%)						
	T	fU	mU	gU	fS	mS	gS
Ahe 3- 5	4,6	3,6	11,7	9,1	59,1	8,3	3,6
Ae 20-25	5,1	4,2	14,1	11,7	55,9	7,4	1,6
Bhs 35-40	13,9	5,0	7,9	10,4	56,3	4,5	2,0
BC 50-55	8,9	2,3	5,7	4,4	70,0	5,4	3,3
C 70-75	14,8	3,9	4,9	1,8	54,3	13,0	7,3

Der Feinboden besteht im Decksediment (Schicht I) aus kaum lehmigen Sand (l'S), im Mittelsediment (Schicht II) aus sandigem Lehm (sL) und im Basissediment (Schicht III) aus lehmigen Sand (l'S). Die Substrate der einzelnen Schichten unterscheiden sich deutlich in ihrer Korngrößenzusammensetzung.

Mineralogische Zusammensetzung

Der Grobboden ist im gesamten Profil vor allem aus Unterquadersandstein zusammengesetzt. Der Feinboden des Decksediments besteht in der Grobsandfraktion aus Quarzkörner, Fragmenten von feinkörnigem Quarzsandstein und Plänersandstein. Im Mittelsand nimmt der Anteil an Quarzkörner zu und die Feinsandfraktion besteht ausschließlich aus Quarz.

Schichtung

Die Schichten unterscheiden sich deutlich im Skelettgehalt sowie in der granulometrischen Zusammensetzung des Feinbodens. Das Basissediment ist als Sandstein-Basisschutt ausgebildet. Das Mittelsediment, eine Sand-Fließerde, ist 25 cm mächtig. Das 30 cm mächtige Decksediment ist ebenfalls eine Sand-Fließerde mit einem höheren Mittel- und Feinsandanteil und einem geringeren Schluffgehalt.

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Chemische Kennwerte						
	pH (KCl)	C (%)	N (%)	C/N	Fe _a (g/kg)	Fe _o	Fe _o /Fe _a
Of	2.7	38,70	1,62	24			
Oh	2.6	37,00	1,42	26			
Ahe 3- 5	2.6	13,80	0,54	26	1,1	0,37	0,35
Ae 20-25	3.0	1,00	0,03	29	0,5	0,04	0,08
Bhs 35-40	2.9	1,80	0,08	22	10,0	8,89	0,89
BC 50-55	3.8				7,0	3,57	0,51
C 70-75	4.0				0,4	0,23	0,64

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte								
	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Cu	Zn	
	(%)							(ppm)	
Of	0,08	0,06	0,19	0,05	1,48	0,01	32	88	
Oh	0,07	0,05	0,19	0,03	1,00	0,01	25	93	
Ahe 3- 5	0,02	0,28	0,11	0,04	1,05	0,01	18	42	
Ae 20-25	0,01	0,34	0,04	0,03	0,54	<0,01	7	6	
Bhs 35-40	0,02	0,44	0,04	0,11	1,99	0,01	12	21	
BC 50-55	0,01	0,37	0,02	0,08	1,21	<0,01	9	16	
C 70-75	0,02	0,39	0,00	0,10	1,51	0,01	15	24	

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Sorptionswerte			
	S	H	T	V
	(mval/100g)			(%)
Of	9,6	41,8	51,4	19
Oh	7,9	38,6	46,5	17
Ahe 3- 5	6,1	27,0	33,1	18
Ae 20-25	1,4	3,1	4,5	30
Bhs 35-40	0,5	11,6	12,1	4
BC 50-55	1,4	4,5	5,9	24
C 70-75	0,9	3,8	4,7	19

Interpretation

An der Steilstufe des Unterquadersandsteins ist ein stark gegliedertes Profil mit der Schichtenfolge Basissediment-Mittelsediment-Decksediment aufgeschlossen.

Das Basissediment tritt 6,5 dm unter Flur als über 7 dm mächtiger Sandstein-Basisschutt auf. Der Feinboden zeichnet sich durch ein eingipfeliges Maximum in der Feinsandfraktion (54 M.-%) aus. Das 3 dm mächtige Mittelsediment ist nicht durchgehend ausgebildet. Meist trägt es den Charakter eines Zwischensedimentes, das sowohl granulometrisch als auch mineralogisch zwischen Basissediment und Decksediment vermittelt. Im unteren Teil ist ein starker Einfluß des Basisschutts (Feinsandmaximum von 70 M.-%) zu erkennen, im oberen Teil deutet der Anstieg der Grobschlufffraktion auf eine geringe äolische Beimengung hin.

Im Decksediment, das als lehmig-schluffige Feinsand-Fließerde oder als Sand-Deckschutt ausgebildet ist, kann ebenfalls ein Lößlehmeinfluß festgestellt werden. Das Skelett setzt sich vor allem aus Unterquadersandstein zusammen. Die Grobsandfraktion des Feinbodens besteht aus gut gerundeten bis kantengerundeten Quarzen, aus feinkörnigem Quarzsandstein und Plänersandsteinfragmenten. Im Mittelsand nimmt der Anteil an Einzelquarzen zu (90 %), die häufiger gut gerundet bis gerundet sind. Die Feinsandfraktion wird ausschließlich aus schwach gerundeten Einzelquarzen aufgebaut. Glimmer sind nicht zu beobachten (Thalheim 1988).

Profil 6

Lage: Revier Tharandt, Abt. 229 a°, 410 m NN

Geologie: Pennricher Sandstein (Plenus-Zone, Dölzschener Schichten)

Relief: oberhalb einer Steilstufe auf nach NO geneigter Verebnung

Vegetation: Fichtenbestand mit einzelnen Lärchen, Birken und Kiefern

Humusform: Rohhumus

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrichrept

FAO: Dystric Cambisol, Spodo-Dystric Cambisol

DBG: Podsol-Braunerde

Standortskartierung: Spechtshausener Lehmsandstein-Braunpodsol

Profilbeschreibung

O	6- 0 cm;	Auflagehumus
I Aeh	0- 10 cm;	grauer (10 YR 6/1), mäßig bis stark humoser, stark steiniger, sandiger Lehm bis lehmiger Schluff; Einzelkorngefüge; mittlere Durchwurzelung; deutlicher Übergang zum v-Horizont
II Bv	10- 50 cm;	hellbrauner (10 YR 7/3), schwach bis

mäßig steiniger Schlufflehm;
 Kohärentgefüge; mittel bis schwach
 durchwurzelt; diffuser Übergang zum
 B/C-Horizont

III B/C1 50- 65 cm; hellgelbbrauner (10 YR 6/4), stark
 steiniger, grusiger, sandiger Lehm; an
 der Untergrenze Steinanreicherung;
 schwach durchwurzelt

B/C2 65-100 cm; rosafarbener (7,5 YR 7/4), mäßig
 steiniger, grusiger Lehm; schwach
 durchwurzelt; deutlicher Übergang zum
 Zersatz

IV1 100-110 cm; hellrötlicher (5 YR 6/4), sehr schwach
 grusiger Sand; scharfe Untergrenze

IV2 110-135 cm; hellbrauner (7,5 YR 6/4), mäßig
 grobkörniger, steiniger Sand

IV3 135-150 cm; rosafarbener, kaum lehmiger Sand

IV4 150-170 cm; hell rötlichbrauner, steinig-grusiger
 Sand

IV5 170-210 cm; hellbrauner, sehr schwach grusiger Sand
 mit Fossilien

Analysenergebnisse

Horizont/			Korngrößenverteilung (M.-%)						
Entnahmetiefe (cm)			T	fU	mU	gU	fS	mS	gS
I	Aeh	0- 10	15,2	10,0	18,2	22,6	18,4	9,4	6,2
II	Bv	10- 50	21,5	9,6	18,5	25,2	13,0	7,8	4,4
III1	B/C1	50- 65	16,9	7,4	6,0	7,4	30,6	22,4	9,3
III2	B/C2	65-100	18,9	8,6	5,3	4,6	33,7	24,0	4,9
IV1		100-110	2,5	1,8	1,9	1,2	90,1	2,3	0,2
IV2		110-135	11,0	3,0	2,1	1,1	79,5	2,8	0,4
IV3		135-150	3,0	2,5	1,6	2,4	88,1	2,3	0,1
IV4		150-170	12,2	3,7	2,4	2,1	76,7	2,5	0,4
IV5		170-210	1,8	1,4	2,2	2,3	91,5	0,8	0,0

Der Zersatz des Pennsylvanischer Sandsteins (Schicht IV) ist als reiner Sand (rS) und kaum lehmiger (l'S) bis stark lehmiger Sand (TS) ausgebildet. Die Korngrößenanalytische Auswertung ergibt einen scharfen Wechsel zwischen den Feinsand- und Tongehalten der einzelnen Schichten des Zersatzes. In den tonreichen Horizonten hat sich das bei der Zersetzung des Glaukonits freigewordene Eisen wieder ausgeschieden. Die tonreichen Schichten besitzen einen deutlich brauneren Farbton. Die Sande haben ein Korngrößenmaximum in der Feinsandfraktion (H fS, 76,6-91,1 M%). Die Teilschichten des Zersatzes unterscheiden sich teilweise erheblich in ihren sedimentpetrographischen Kennwerten. Die

Sortierungskoeffizienten schwanken zwischen 1,37-1,50 und weisen nach SINDOWSKI (1961) auf eine gute Sortierung hin, die für küstennahe Sedimente typisch ist.

Die unterschiedlichen Tongehalte können primär durch die Sedimentation bedingt sein, wurden aber durch diagenetische und andere Prozesse (Entkalkung, Glaukonitzerersetzung) verstärkt.

Über dem Zersatz des Pennricher Sandsteins ist die pleistozäne Schichtenfolge ausgebildet. Die einzelnen Schichtglieder unterscheiden sich hinsichtlich der Körnung deutlich voneinander. Das Basissediment (Schicht III) ist als sandiger Lehm (sL) und Lehm (L) ausgebildet, besitzt eine sehr schlechte Sortierung (6,29-7,22), ein Korngrößenmaximum im Feinsand (H: fS, 30,3-32,8 M%) und stellt ein Mischsediment aus liegendem Sandsteinverwitterungsmaterial und Fremdkomponenten dar. Im Mittelsediment (Schicht II), nach der Körnungsart Schlufflehm (UL), ist der Lößlehmeinfluß deutlich ausgeprägt, gekennzeichnet durch den charakteristischen Anstieg der Kornsummenkurve zwischen 10 und 63 μm und den hohen Feinheitsgrad (65,8).

Im Decksediment (Schicht I) ist ebenfalls eine gewisse äolische Beimengung zu verzeichnen. Die Hauptkorngrößenfraktion liegt in diesen beiden Schichten im Grobschluffbereich (H: gU, 22,6-24,2 M %)

Mineralogische Zusammensetzung

Der Grobboden des Decksediments, Mittelsediments und des

hängenden Teils des Basissediments besteht vor allem aus Plänersandstein. Im liegenden Teil des Basissediments nimmt der Plänersandsteinanteil stark ab.

Der Feinboden des Decksediments besteht aus Quarz, vereinzelt Glimmer und Plänersandsteinbruchstücken. Der Quarzanteil stammt aus dem Plänersandstein. Das Mittelsediment ist in der Grob- und Mittelsandfraktion ähnlich dem Decksediment zusammengesetzt. Vereinzelt kommen Rhyolithbruchstücke und unzersetzter Pennricher Sandstein hinzu. Im Mittelsediment tritt äolischer Quarz mit mattierter Oberfläche auf. In der Feinsandfraktion geht der Plänersandsteinanteil stärker zurück als im Decksediment, der Glimmeranteil ist höher. Die Quarze sind gerundet, besitzen eine indifferent glänzende Oberfläche und sind seltener mit Plänersandsteinbindemittel behaftet.

Im hangenden Teil des Basissediments steigt der Anteil an Quarzkörnern nach den feineren Korngrößen, der Anteil Plänersandstein nimmt ab. Äolische Quarze sind nur noch vereinzelt zu beobachten. Hellglimmer treten vereinzelt in der Feinsandfraktion auf. Im liegenden Teil sind in der Grob- und Mittelsandfraktion neben Quarzkörnern Pennricher Sandstein und Bruchstücke von Fossilschalen beigemischt. Plänersandstein ist seltener. In der Feinsandfraktion dominieren Quarzkörner, die aber gerundeter und isometrischer als im hangenden Teil erscheinen. Glimmer treten nur vereinzelt auf. In dieser Schicht macht sich der größere Einfluß des Pennricher Sandsteins bemerkbar. Der Zersatz des Pennricher Sandsteins setzt sich im

Grobsand aus unzersetztem Sandstein, Quarkörnern (kantengerundet bis schwach gerundet), Fossilschalen und wenigen Kieselgelausscheidungen zusammen. Nach den feineren Korngrößen nimmt der Anteil an Quarzkörnern zu. Die Feinsandfraktion besteht nur noch aus einzelnen Quarzkörnern mit wenig Glimmer. Die Teilschichten des Zersatzes unterscheiden sich in ihrer mineralogischen Zusammensetzung wenig voneinander.

Schichtung

Das gesamte Profil ist hinsichtlich Skelettgehalt und -zusammensetzung, Granulometrie und Mineralzusammensetzung des Feinbodens durch deutliche Unterschiede zwischen und innerhalb der Schichten gekennzeichnet. Der Zersatz des Pennsylvanischer Sandsteins ist mehr als 1,10 m mächtig, im Sand-Basisfließerde ausgebildet und stark vom Sandsteinzersatz beeinflusst. Im oberen Teil steht Sandstein-Basisschutt an, dessen Skelett hauptsächlich aus Plänersandstein besteht.

Das Mittelsediment, ein Gebirgslöß, zeigt einen markanten äolischen Einfluß.

Das Decksediment ist mehr als 10 cm mächtig und als lehmiger (lößhaltiger) Sandstein-Deckschutt ausgebildet.

Deck- und Mittelsediment unterscheiden sich in der mineralogisch-petrographischen Zusammensetzung.

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Chemische Kennwerte		
	Fe _a	Fe _o	Fe _o /Fe _a
	(g/kg)		
Aeh 0- 10	3,6	1,90	0,53
Bv 10- 50	9,5	3,36	0,35
B/C1 50- 65	7,5	0,94	0,13
B/C2 65-100	12,1	1,99	0,17
IV1 100-110	1,7	0,16	0,10
IV2 110-135	5,6	0,44	0,08
IV3 135-150	0,9	0,12	0,14
IV4 150-170	2,7	0,57	0,21
IV5 170-210	3,0	0,27	0,09

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte (%)									
	P	K	Ca	Mg	Fe	Al	Ti	Na	S	Mn
Aeh 0- 10	0,01	0,94	0,10	0,08	0,78	2,00	0,36	0,28	0,02	0,01
Bv 10- 50	0,02	1,34	0,12	0,21	1,97	3,28	0,35	0,38	0,03	<0,01
B/C1 50- 65	0,01	0,46	<0,02	0,11	1,64	2,30	0,15	0,05	0,02	0,01
B/C2 65-100	<0,01	0,54	<0,02	0,10	0,92	2,60	0,17	0,04	<0,02	<0,01
IV1 100-110	<0,01	0,10	<0,02	0,03	0,27	0,58	0,26	0,02	<0,02	<0,01
IV2 110-135	<0,01	0,22	<0,02	0,09	0,76	1,60	0,25	0,02	<0,02	<0,01
IV3 135-150	<0,01	0,08	<0,02	0,02	0,18	0,46	0,22	0,02	<0,02	<0,01
IV4 150-170	<0,01	0,23	<0,02	0,08	0,64	1,78	0,24	0,02	<0,02	<0,01
IV5 170-210	<0,01	0,10	<0,02	0,02	0,18	0,49	0,25	0,02	<0,02	<0,01

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte (ppm)				
	Ba	Cu	Sr	V	Zn
Aeh 0- 10	206	<8	70	22	12
Bv 10- 50	281	9	79	34	35
B/C1 50- 65	93	<8	75	27	19
B/C2 65-100	84	9	91	33	16
IV1 100-110	40	<8	27	<10	<10
IV2 110-135	62	15	43	17	11
IV3 135-150	38	9	28	<10	<10
IV4 150-170	63	9	59	15	14
IV5 170-210	45	<8	26	<10	<10

Interpretation

Das Profil ist hinsichtlich Skelettgehalt und -zusammensetzung, Granulometrie und Mineralogie deutlich in Zersatz, Basissediment, Mittelsediment und Decksediment gegliedert.

Der mehr als 11 dm mächtige Zersatz des Pennricher Sandsteins ist als reiner Sand bis lehmiger Sand ausgebildet und kann schon makroskopisch anhand der Farbe in Teilschichten unterschieden werden. In den tonreichen Teilschichten hat sich das bei der Zersetzung des Glaukonits freigewordene Eisen wieder ausgeschieden; sie besitzen demzufolge einen starken braunen Farbton.

Über dem Zersatz ist die pleistozäne Schichtenfolge ausgebildet. Das 5 dm mächtige Basissediment liegt im unteren Teil als lehmige Sand-Basisfließerde und im oberen Teil als lehmiger Sandstein-

Basischutt vor. In der liegenden Sand-Fließerde sind in der Grob- und Mittelsandfraktion Pennricher Sandstein und Bruchstücke von Fossilschalen beigemengt. Im Sandstein-Schutt sind äolische Quarze in der Mittelsandfraktion zu beobachten und in der Feinsandfraktion tritt vereinzelt Hellglimmer auf.

Im Mittelsediment ist der Lößlehmeinfluß deutlich ausgeprägt. Der Feinboden weist in der Kornsummenkurve den für Gebirgslöß charakteristischen Anstieg zwischen 10 und 63 µm und den Feinheitsgrad von 66 auf.

Als Decksediment tritt ein 1 dm mächtiger lehmiger Sandstein-Deckschutt auf. Deck- und Mittelschutt unterscheiden sich in der mineralogisch-petrographischen Zusammensetzung.

Der Grob- und Mittelsand im Feinboden des Decksedimentes besteht zu gleichen Anteilen aus Einzelquarzen und Plänersandstein. Im Feinsand nimmt der Anteil an gerundeten bis kantengerundeten Einzelquarzen zu. Teilweise stammen diese Quarze aus dem Plänersandstein. Sie sind eckig, kantengerundet bis schwach gerundet mit Bindemittelanflügen. Der Anteil an Plänersandsteinbruchstücken nimmt ab. Glimmer treten sehr vereinzelt auf.

Das Mittelsediment ist in der Grob- und Mittelsandfraktion ähnlich dem Decksediment zusammengesetzt. Vereinzelt kommen Rhyolithbruchstücke und unzersetzter Pennricher Sandstein hinzu. Im Mittelsand ist äolischer Quarz mit mattierter Oberfläche nachgewiesen. In der Feinsandfraktion ist der Glimmeranteil höher. Die Einzelquarze sind stärker gerundet, besitzen eine

indifferent glänzende Oberfläche und sind kaum mit Plänersandsteinbindemittel behaftet.

Profil 7

Lage: Revier Tharandt, Abt. 223 a², 423 m NN
Geologie: Plänersandstein (Cenoman Plenus-Zone, Dölzschener Schichten)
Relief: Verebnung des S-Berges, eben
Vegetation: Fichten-Bestand mit einzelnen Kiefern und Douglasien, Melampyro-Fagetum
Humusform: Rohhumus

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrichrept
FAO: Spodic-Dystric Cambisol
DBG: Podsol-Braunerde
Standortskartierung: Hetzdorfer Lehmsandstein-Braunerde

Profilbeschreibung

0 5- 0 cm; Auflagehumus
I Aeh 0- 8 cm; graubrauner (10 YR 5/2), stark humoser, sehr schwach steiniger, mäßig grusiger, lehmiger Schluff; Plattengefüge; mittlere Durchwurzelung;

deutlicher Übergang zum Bv-Horizont
Bv 8- 65 cm; hellbrauner (10 YR 7/3), mäßig steinig-grusiger, lehmiger Schluff; Kohärent-bis Plattengefüge; mittel bis schwach durch wurzelt; welliger Übergang zum B/C-Horizont
II B/C 65-160 cm; brauner (7,5 YR 5/6) bis rotbrauner (2,5 YR 5/4), blockhaltiger, mäßig bis stark steinig-grusiger Ton; schwach bis sehr schwach durchwurzelt.

Analysenergebnisse

Table with columns: Schicht/Horizont/, Korngrößenverteilung (M.-%), Entnahmetiefe (cm), T, fU, mU, gU, fS, mS, gS. Rows include I Aeh, Bv, II BC1, BC2.

Der Feinboden des Basissediments (Schicht II ist nach der Körnungsart Ton (T), der Anteil der Tonfraktion beträgt 51,9-53,3 M.-%. Das Mittelsediment (Schicht I) ist korngroßenanalytisch deutlich vom Basissediment zu trennen. Die

Körnungart (Schlufflehm bis lehmiger Schluff), der höhere Mittel- und Grobschluffanteil (H: gU, 26,0-27,6 M.-%) sowie der Feinheitsgrad (64,6-68,5) sind Merkmale für Lößlehmeinfluß.

Mineralogische Zusammensetzung

Schicht/Horizont/		Minerale (Fraktion 0,063-0,02 mm, M.-%)						
Entnahmetiefe (cm)		Q	F	G	H	O	R	Q/F
I	Aeh 0- 9							
	Bv 9- 65	18,14	4,23	1,28	0,34	0,15	3,16	4,29
II	BC1 65-100	7,86	1,73	0,68		0,09	3,96	4,54
	BC2 100-110	9,69	2,03	0,45		0,13	4,11	4,77

Q-Quarz, F-Feldspäte, G-Glimmer, H-hochlichtbrechende Minerale, O-Opake Minerale, R-Rest (Gesteinsbruchstücke angewitterte Minerale, verkrustete Minerale etc.)

Der Grobboden des Basissediments ist überwiegend aus Plänersandstein zusammengesetzt. Vereinzelt treten Rhyolithbruchstücke auf. Das Mittelsediment besteht aus Plänersandstein, wenig Rhyolith, kantengerundeten bis gut gerundeten Quarzen und mittelkörnigem Sandstein.

Im Feinboden tritt Quarz in mehreren Ausbildungsformen auf. Häufig sind gerundete, schwach gerundete bis kantengerundete, milchigweiße bis klar durchsichtige Quarze mit indifferenter bis

glatter glänzender Oberfläche und authigenen Aufwachsungen aus dem Sandstein. Weiterhin treten gerundete bis gut gerundete farblose oder milchigweiße Quarze mit mattierter Oberfläche (äolischer Typ) oder idiomorpher bis hypidiomorpher Hochquarz mit korrodierter Oberfläche (Rhyolithquarz) auf. Im Basissediment sind die Quarze in den feineren Fraktionen oft mit Tonhäutchen und Brauneisenkrusten überzogen.

Die Alkalifeldspäte (Orthoklas, Albit) sind häufig angewittert. Im Grobschluff kommen auch Mikroklin und Perthit vor. Oligoklase zeigen ebenfalls Korrosionsspuren.

Der Glimmeranteil setzt sich aus Hellglimmer, gebleichtem Biotit und Dunkelglimmer (Biotit, Chlorit) zusammen.

In den Sandfraktionen sind Gesteinsbruchstücke, vor allem von Plänersandstein und untergeordnet von Rhyolith und Sandstein (Quarzkörner mit Durchmesser 100-150 µm) verbreitet. Zum Rest werden verkrustete Minerale (Brauneisenkrusten, Tonhäutchen), zersetzte Minerale (Feldspäte), Bioopal (im Basissediment) und Kaolinit gezählt.

Das Mittelsediment ist durch höhere Quarzgehalte in allen Fraktionen gekennzeichnet, die in den gröberen Fraktionen auf den größeren Anteil an zersetztem Sandstein und im Grobschluff auf die äolische Komponente zurückzuführen sind. Der Lößlehmanteil im Mittelsediment bedingt auch die höheren Feldspat- und Glimmergehalte in den feineren Fraktionen.

Im Basissediment sind höhere Anteile an Gesteinsbruchstücken zu verzeichnen.

Der Tonmineralbestand läßt einen Schichtunterschied erkennen, der durch eine primär differenzierte Mineralzusammensetzung sowie unterschiedliche sekundäre Umbildungsvorgänge erklärbar ist. Der Ton des Mittelsediments besteht aus Kaolinit, Illit, einem Illit-Vermiculit-Wechselagerungsmineral sowie Vermiculit. Der Vermiculitanteil und die Illit-Vermiculit-Wechselagerungen sind auf jüngere Umbildungsvorgänge in den oberen Bodenhorizonten zurückzuführen und resultieren aus der Glimmerverwitterung. Kaolinit und Illit sind dem primären Tonmineralbestand dieser Schicht zuzurechnen.

Das Basissediment ist vor allem aus Kaolinit sowie aus Illit zusammengesetzt. Der Plänersandstein ist unter subtropischem Klima im Tertiär (Paläogen bis tieferes Miozän) zu Braunton/Braunlehm verwittert. Dabei unterlagen das tonige Bindemittel, feinkörnige Feldspatbestandteile und Glimmer der Verwitterung. Es kam zur Bildung von Kaolinit und Illit.

Schichtung

Die Schichten unterscheiden sich in Skelettgehalt, granulometrischer und mineralogischer Feinbodenzusammensetzung. Das liegende Basissediment ist mehr als 45 cm mächtig und als Sandstein-Basisschutt ausgebildet. Als Feinbodenkomponente enthält es einen fossilen, tertiären (prämiozänen) Braunton. Das hangende Mittelsediment ist 65 cm mächtig, wesentlich skelettärmer und als Gebirgslöß mit einem starken äolischen

Anteil entwickelt. Im Profil ist kryoturbates Bodengefüge zu beobachten.

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Chemische Kennwerte						
	pH (KCl)	C (%)	N (%)	C/N	Fe _a (g/kg)	Fe _o	Fe _o /Fe _a
Of	2.9	42,2	1,49	28			
Oh	3.1	36,4	1,33	27			
Aeh 0- 8	2.9	4,1	0,29	14	5,2	3,23	0,63
Bv 8- 65	3.6				5,9	1,70	0,29
B/C 65-130	3.5				20,8	1,03	0,05

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Gesamt-Elementgehalte							
	P	K	Ca	Mg (%)	Fe	Mn	Cu	Zn (ppm)
Of	0,10	0,08	0,16	0,04	0,92	0,01	24	87
Oh	0,08	0,08	0,15	0,05	1,12	0,01	25	91
Aeh 0- 8	0,02	1,30	0,15	0,11	0,76	0,01	6	19
Bv 8- 65	0,02	1,72	0,18	0,28	1,46	0,03	9	40
B/C 65-130	0,03	1,42	0,06	0,49	3,63	0,02	24	54

Horizont/ Entnahmetiefe (cm)	Sorptionswerte			
	S	H	T	V
	(mval/100g)			(%)
Of	8,4	92,0	100,4	8
Oh	8,2	95,2	103,4	8
Aeh 0- 8	2,2	15,9	18,1	12
Bv 8- 65	3,9	7,2	11,1	35
B/C 65-130	4,3	15,6	19,9	22

Interpretation

Profil 7 auf dem Plänersandstein-Plateau zeigt die Schichtenabfolge Blockablösungszone - Basissediment - Mittelsediment. Die Blockablösungszone setzt 16 dm unter Flur ein. Sie besteht aus annähernd horizontal gelagertem Plänersandstein. Die vorhandenen Gesteins-Zwischenräume sind mit fossilem Braunlehm ausgefüllt. Darüber lagert ein knapp 10 dm mächtiges Basissediment, das als Sandstein-Basisschutt ausgebildet ist. Die Feinbodenkomponente besteht aus fossilem Braunlehm. Der Braunlehm ist nach der Körnungsart Ton mit Anteilen der Tonfraktion zwischen 52 und 53 M.-%.

Der Tonmineralbestand ist vor allem aus Kaolinit und Illit zusammengesetzt. Der Braunlehm ist unter subtropischem Klima aus Plänersandstein entstanden und markiert eine fossile Verwitterung.

Die steilgestellten Plänersandsteinplatten deuten auf eine kryoturbate "Durchmischung" der Schicht hin.

Das hangende Mittelsediment ist 6,5 dm mächtig, wesentlich skelettärmer und als Gebirgslöß mit einem starken äolischen Anteil entwickelt. Die Körnungsart ist Schlufflehm bis lehmiger Schluff. Der höhere Mittel- und Grobschluffanteil sowie der Feinheitsgrad (65-69) sind Merkmale für Lößlehmeinfluß. Der Tonmineralbestand des Mittelsedimentes besteht aus Kaolinit, Illit, einem Illit-Vermiculit-Wechselagerungsmineral sowie Vermiculit. Der Vermiculitanteil und die Illit-Vermiculit-Wechselagerungen sind auf jüngere Umbildungsvorgänge in den oberen Bodenhorizonten zurückzuführen und resultieren aus der Glimmerverwitterung.

4. Exkursion Teil II: Pleistozäne Deckschichten der Catena Buchhübel (Sonnabend, 14.5.94)

Die Catena Buchhübel (Tharandter Wald) wurde, wie die Catena S - Berg, in einem Areal angelegt, in dem das Substrat auf relativ kurze Entfernung stark wechselt (siehe Abb. 13).

Der geologische Bau der Catena Buchhübel weist einige Besonderheiten auf. Die Oberkreidesedimente liegen dem jüngeren Quarzporphyr (Oberkarbon) auf. Allerdings fehlen hier die Niederschönaer Schichten, der Unterquadersandstein und der Pennreicher Sandstein, die innerhalb der Catena S - Berg vorhanden sind. Die kretazischen Sedimente setzen erst mit dem Plänersandstein ein. Diese primäre Schichtlücke ist durch eine

Abb. 13: Geologisches Profil durch die Catena Buchhübel mit der Lage der vorgestellten Profile; 1 - Älterer Quarzporphyr (Oberkarbon); 2 - Jüngerer Quarzporphyr (Oberkarbon); 3 - Plänersandstein (Oberkreide); 4 - tertiäre Flußsande und Tone; 5 - Süßwasserquarzit ("Tertiärquarzit"); 6 -Basalt (Olivin-Nephelinit)(Tertiär); 7 - Quellaustritte

Abb. 13

Die Entstehung der obererzgebirgischen Basaltberge
 ① Zu Beginn des Tertiärs: Flüsse auf flachem Land
 ② Im Tertiär förderte ein Vulkan dünnflüssige Basaltlava, die sich in die Flußtäler ergoß
 ③ Vom Ende des Tertiärs bis zur Gegenwart wurde das Land von der Abtragung zertalt, der Basalt blieb in Form von Bergen stehen; E Eruptionszentrum (Vulkanschlote) bei Oberwiesenthal und Hammerunterwiesenthal
 Links: die Reliefumkehr des Pöhlerberges in Profilen

Abb. 14: Schematische Darstellung der Entstehung der obererzgebirgischen Basaltberge, die auf die Situation am Buchhübel übertragbar ist (Darstellung aus WAGENBRETH & STEINER, 1982)

Hochlage des Gebietes zur Zeit der Cenoman-Transgression erklärbar. Der Plänersandstein wird im Hangenden durch tertiäre Flußsedimente (Sande und Tone) gekappt (siehe Abb. 13). Im oberen Teil dieser Sequenz wurden durch die Ausscheidung von Kieselsäure aus dem Porenwasser, das die Flußsande durchströmte, Süßwasserquarzite (sog. "Tertiärquarzite") gebildet. Im Jungtertiär benutzte ein Basaltstrom das Tal des tertiären Flusses (schematische Darstellung siehe Abb. 14).

Profil 8

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a1, 365 m NN
 Geologie: Rhyolith
 Relief: flacher nach NW streichender Riedel, mit 6° nach NE geneigter Oberhang
 Vegetation: Buchengrundbestand, einzelne Lärchen eine Birke
 Humusform: Moder

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrachrept
 FAO: Dystrict Cambisol
 BG: Podsol-Braunerde
 Standorts-
 kartierung: Klingenberg Porphyr-Braunerde

Profilbeschreibung

0 Humusauflage
 I Aeh 0- 5 cm; dunkelgraubrauner (10 YR 4/2), humoser, schwach grusiger, Schlufflehm; Kohärentgefüge; schwach verfestigt; mittlere Durchwurzelung; diffuser Übergang zum Bv-Horizont
 Bv 5 - 80 cm; hellbrauner (10YR 7/3), mittelgrusiger Schlufflehm; Kohärentgefüge; mittel verfestigt; schwache bis mittlere Durchwurzelung; deutlicher welliger Übergang zum BC-Horizont
 II BC 80 - 150 cm; hellbrauner (7,5 YR 6/4) bis pinkgrauer (7,5 YR 6/2), lehmig schluffiger Skelettboden; fest; schwach bis sehr schwach durchwurzelt

Profil 9

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a1, 392 m NN
 Geologie: Tertiäres Flußsediment
 Relief: Nordflanke des Buchhübels
 Vegetation: Buchengrundbestand
 Humusform: rohhumusartiger Moder

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrachrept

FAO: Spodic- Dystric Cambisol
 DBG: Podsol-Braunerde
 Standortskartierung: nicht gesondert ausgeschieden

Profilbeschreibung

O Organische Auflage

I Aeh 0- 8 cm; braungrauer (10 YR 4/2), schwach humoser, schwach skeletthaltiger, lehmig schluffiger Sand; Kohärentgefüge; lose; mittlere Durchwurzelung, deutlicher Übergang zum Bv1-Horizont

Bv1 8- 35 cm; hell braungrauer bis blaßbrauner (10 YR 6/2- 6/3), schwach skeletthaltiger, lehmig-schluffiger Sand; Kohärentgefüge; lose; mittel bis stark durchwurzelt; diffuser Übergang zum Bv2-Horizont

Bv2 35-120 cm; blaßbrauner (10YR 6/3), schwach skeletthaltiger, lehmig schluffiger Sand (in dem ein Süßwasserquarzit eingelegt ist); Kohärentgefüge; mittel verfestigt; schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zum BC-Horizont

II BC 120- 150 cm; blaßbrauner bis hell gelbbrauner (10 YR 6/3-6/4) schwach skeletthaltiger lehmig-

schluffiger Sand; mittel verfestigt; sehr schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zum anstehenden tertiären Flußsediment

III C1 150- 260 cm; anstehendes tertiäres Flußsediment, gebändert, teilweise linsenartige Substanzablagerungen (im Strömungsschatten), Korngrößen können deshalb linsenförmig nebeneinander auftreten; fest; deutliche Grenze zum C2-Horizont

C2 260 cm und weißer (10 8/2-8/3), skelettfreier Ton; fest bis sehr fest

Profil 10

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a¹, 398 m NN

Geologie: Basalt (Olivin-Augit-Nephelinit) über Tertiärquarzit

Relief: Basaltkuppe des Buchhübels

Vegetation: lichter Buchenaltbestand; Übergang zu jüngerem Buchenbestand mit einzelnen Lärchen und Fichte

Humusform: moderartiger Mull

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Hapludoll

FAO: Eutric Cambisol

DBG: Basenreiche Braunerde

Standortskartierung: Schönbrunner Basalt-Braunerde

Profilbeschreibung

O Auflagehumus

I Ah 0- 3/8 cm; dunkel graubrauner (10 YR 4/2), stark humoser; lehmig-schluffiger Skelettboden; Krümel-bis Polyedergefüge; lose; stark bis sehr stark durchwurzelt; sehr diffuser Übergang zum Bv-Horizont

Bv 3/8-50 cm; graubrauner (10 YR 5/2), schwach humoser lehmig-schluffiger Skelettboden; Polyedergefüge; mittlere Durchwurzelung; im oberen Teil(-30 cm lose, im unteren Teil (-50 cm) mittel verfestigt; diffuser Übergang zum BC-Horizont

BC1 50-80 cm; graubrauner (10 YR 5/2), lehmig-schluffiger Skelettboden; Kohärentgefüge; mittel verfestigt; schwach bis sehr schwach durchwurzelt; deutlicher Übergang zu Blockablösungszone

I/II BC2 80-95/100 cm; brauner (10 YR5/3), lehmig-schluffiger Skelettboden; Übergang zum plattig

anstehenden ^{Tertiär quarzite} Plänersandstein

II Cv 95/100 cm und anstehender ^{Tertiär quarzite} Plänersandstein tiefer

Profil 11

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a¹, 395 m NN

Geologie: Basalt (Olivin-Augit-Nephelinit)

Relief: S-Seite der Basaltkuppe des Buchhübels

Vegetation: lichter Buchenaltbestand; einzelne Lärchen, abgestorbener Fichtenunterstand

Humusform: moderartiger Mull

Bodenklassifikation

Soil Txonomy: Typic Hapludoll

FAO: Eutric Cambisol

BG: Basenreiche Braunerde

Standortskartierung: Schönbrunner Basalt-Braunerde

Profilbeschreibung

O Auflagehumus

I Ah 0-5/10 cm; in der Mächtigkeit stark wechselnder, dunkel bis sehr dunkel grauer (10 YR 4/1), stark humoser, stark steinig-grusiger, lehmiger Schluff; Krümel-bis Polyedergefüge; lose; stark

durchwurzelt; diffuser Übergang zum Bv1-Horizont

Bv1 5/10-40 cm; dunkel graubrauner (10 YR 4/2), schwach humoser, stark steinig-grusiger, lehmiger Schluff; Polyedergefüge; mittel verfestigt; mittlere Durchwurzelung; diffuser Übergang zum Bv2-Horizont

Bv2 40-60 cm; brauner bis dunkelbrauner (10 YR 4/3), sehr stark steinig-grusiger, lehmiger Schluff; Kohärentgefüge; mittel verfestigt; mittlere Durchwurzelung; deutlicher Übergang zum BC-Horizont

II BC 60-150 cm; Dunkelbrauner (10 YR 3/3), lehmig-schluffiger Skelettboden; mittel bis stark verfestigt; mittel bis schwach durchwurzelt

Profil 12

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a¹, 386 m NN

Geologie: tertiäres Flußsediment

Relief: flacher sonnseitiger Hang mit 6° Neigung

Vegetation: Buchengrundbestand

Humusform: Moder

Bodenklassifikation

Soil Taxonomy: Typic Dystrochrept

FAO: Spodic-Dystric Cambisol

DBG: Podsol-Braunerde

Standortskartierung: Hetzdorfer Lehmsandstein-Braunerde

Profilbeschreibung

0 Auflagehumus

I Ah 0-5 cm; dunkelgrauer bis sehr dunkelgrauer (10 YR 4/1-3/1), schwach humoser bis humoser, schwach steinig-grusiger, sandiger Schluff; Kohärentgefüge; lose; mittel durchwurzelt; welliger unregelmäßiger Übergang zum Bv1 - Horizont

Bv1 5-30 cm; blaßbrauner (10 YR 6/3), schwach steinig-grusiger, sandiger Schlufflehm mit kleinen Basaltgeröllen; Kohärentgefüge; lose, stark durchwurzelt; welliger Übergang zum Bv2-Horizont; an der Basis Basaltsteine angereichert

II Bv2 30-55/60 cm; hellgrauer bis sehr blaßbrauner (10 YR 7/2-7/3), schwach steinig-grusiger, sandiger Schlufflehm mit größeren Basaltgeröllen als im Bv1; Kohärentgefüge; lose schwach bis sehr schwach durchwurzelt; diffuser Übergang

zur Schicht III

III BC 55/60-80/85 cm; rötlich brauner (5 YR 5/4), schwach steingrusiger, lehmiger Sand; Kohärentgefüge; mittel verfestigt; sehr schwach durchwurzelt; deutlich-welliger Übergang zur Schicht IV; Untergrenze wird durch Süßwasserquarzite markiert

IV C1 80/85-125/135 cm; sehr blaßbrauner (10 YR 7/4), schwach steinig-grusiger, schluffig-toniger Sand bis sandig-schluffiger Ton; diffuser Übergang zur Schicht V

V C2 125/135-170/180 cm; hell rötlich brauner (5 YR 6/4, sehr schwach steinig-grusiger, lehmiger Sand, gebändertes fluviatiles Sediment; fest: deutlich wellige Grenze zur Schicht VI

VI C3 170/180-215/225 cm; gelblich roter (5 YR 5/6), sehr schwach steinig-grusiger, lehmiger Sand; fest; deutliche Grenze zur Schicht VII

VII C4 215/225 cm und tiefer; weißer bis sehr blaßbrauner (10 YR 8/2-8/3) skelettfreier Ton; fest bis sehr fest

Profil 13

Lage: Revier Hetzdorf, Abt. 545 a¹, 386 m NN

Geologie: Tertiäres Flußsediment über

Plänersandstein

Relief: flacher sonnseitiger Hang mit 6° Neigung

Vegetation: Buchengrundbestand, einzel- und gruppenweise Lärche beigemischt

Humusform: Moder

Profilbeschreibung:

0 Humusauflage

I Ah 0- 5 cm; dunkelgrauer bis sehr dunkelgrauer (10 YR 4/1-3/1), schwach humoser bis humoser, schwach steinig-grusiger, sandiger Schluff; Kohärentgefüge; lose; mittel durchwurzelt; diffuser Übergang zum Bv1-Horizont

Bv1 5-20/30 cm; blaßbrauner bis hell gelbbrauner (10 YR 6/3-6/4), schwach steinig-grusiger, sandiger Schlufflehm; Kohärentgefüge; lose; stark durchwurzelt; diffuser Übergang zum Bv2-Horizont

Bv2 20/30-55 cm; blaßbrauner (10 YR 6/3), schwach bis mittel steinig-grusiger, sandiger Schlufflehm; Kohärentgefüge; lose; schwach durchwurzelt; diffuser Übergang zum BC-Horizont mit einzelnen eingelagerten Blöcken; vereinzelt gerundete Flußkiese

- II BC 55-65/75 cm; hell rötlich brauner (5 YR 6/3), sehr schwach steinig-grusiger, lehmiger Sand; Kohärentgefüge; mittel verfestigt; sehr schwach durchwurzelt; Horizont keilt im linken Profiltteil aus; deutlicher welliger Übergang zur Schicht III
- III C1 65/75-90 cm; sehr blaß brauner (10 YR 7/3-8/3), sehr schwach skeletthaltiger, feinsandiger Ton; fest bis sehr fest, nicht durchwurzelt:
- IV C2 90-120 cm; rotbrauner bis gelbbrauner (5 YR 4/4-4/6), sehr schwach steinig-grusiger, lehmiger Sand; sehr fest; deutlicher Übergang zur Schicht V
- V C3 120 cm und tiefer; plattiger Plänersandstein mit sehr hellbraunen bis gelben (10 YR 7/4-7/6) sandigen Nestern

Literatur zu Abschn. 1

- AUTORENKOLLEKTIV: Erläuterung zur Geologischen Übersichtskarte der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig (1 : 400 000). VEB Geologische Forschung und Erkundung Halle. Freiberg, (1972), 78 S.
- BANKWITZ, P.; BENEK, R.; FRISCHBUTTER, A.; TRÖGER, K.-A.: Die Elbezone als Teil des Elbe-Lineamentes (Gebiet der DDR). In: Exkursionsführer, Vortrags- und Exkursionstagung vom 28. - 29. 4. 1983. Dresden, (1983), Gesellsch. f. Geol. Wiss. d. DDR, 31 S.
- BENEK, R.: Geologisch-strukturelle Untersuchungen im Tharandter Vulkanitkomplex (Südteil DDR). In: Geol. Wiss., 8 (1980) 6, S. 627-643
- FIEDLER, H.-J.; THALHEIM, K.: Geologisch-pedologischer Exkursionsführer Osterzgebirge - Teil I, Geologie und Petrographie. Sektion Forstwirtschaft. Technische Universität Dresden (1989), 83 S.
- FRANKE, W.: Variszischer Deckenbau im Raume der Münchberger Gneismasse - abgeleitet aus der Fazies, Deformation und Metamorphose im umgebenden Paläozoikum. In: Geotekt. Forsch., 68 (1984), 253 S.
- HOFMANN, J.: Petrographische und lithostratigraphische Stellung der Gneise des Osterzgebirges. Leipzig. Freiburger Forschungsheft C 292. (1974).
- HOFMANN, J.; LORENZ, W.: Saxothuringikum des Erzgebirges im Gebiet der CSSR und DDR (Anteil DDR), Kristallin des Osterzgebirges - Exk. F2. Berlin. Exkursionsführer, Gesellsch. f. Geol. Wiss. d. DDR, (22. Jahrestag.). (1975). S. 56-76.
- HOTH, K.; LORENZ, W.; HIRSCHMANN, G.; BERGER, H.-J.: Lithostratigraphische Gliederungsmöglichkeiten regionalmetamorpher Jungproterozoikums am Beispiel des Erzgebirges. In: Z. geol. Wiss., 7 (1979), S. 377-404
- HOTH, K.; LORENZ, W.: Proterozoikum am Nordwestrand des Böhmisches Massivs, Berlin, Anlageblatt im Exkursionsführer zur GGW-Vortrags- und Exkursionstagung vom 23. bis. 26.5.90, Mönchenfrei, Erzgeb., (1990), 47 S.
- HOTH, K.; WASTERNAK, J.; BERGER, H.-J.: Metallogenetisches Kartenwerk Erzgebirge/Vogtland - Geologische Karte. Zentrales Geologisches Institut. Berlin. (1980).
- KUPETZ, M.: Stratigraphie und regionale Stellung des variszisch gefalteten Paläozoikums im Nossen - Wilsdruffer Schiefergebirge, Freiburger Forschungsheft C 415. VEB DT. Verl. f. Grundstoffind., Leipzig, (1987), 5-41.

- KURZE, M.; LINNEMANN, U.G.; TRÖGER, K.A. Weesensteiner Gruppe und Altpaläozoikum in der Elbtalzone (Sachsen). Geotekt. Forsch. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 77 (1992), 101-167.
- KURZE, M.; TRÖGER, K.-A.: Die Entwicklung des Paläozoikums in der Elbtalzone (Saxothuringikum). In: N. Jb. Geol. Paläont. Mh., (1990) 1, 43-53.
- LENTSCHIG, S.: Abriß der Geologie des Tharandt-Grillenburger Waldes. In: Wiss. Zeitschr. d. TU Dresden, 11 (1962) 5, S. 1167-1179.
- LEONHARD, D.; KRENZ, O.; WIEMEIER, G.; HOTH, K.; KEMNITZ, H.: Proterozoikum im Mittelerzgebirge; In: Proterozoikum am Nordwestrand des Böhmisches Massivs, Berlin. Exkursionsführer zur GGW-Vortrags- u. Exkursionstagung vom 23. bis 26.5.90 in Mönchenfrei, Erzgeb., (1990), S. 5-23.
- LINNEMANN, U.; KURZE, M. & SEHNERT, M.: Nachweis von altpaläozoischen Acritarchen und einige neue Ergebnisse lithostratigraphischer Untersuchungen im Elbtalschiefergebirge. In: Veröff. Museum d. Westlausitz Kamenz. (1988) 12. 44-51.
- MOESTA, G.: Brüche und Porphyreffusionen im östlichen Erzgebirge. In: Z. deutsch. geol. Ges., 80 (1928). S. 343-408.
- NEBE, W.: Über präcenomane Böden auf osterzgebirgischen Gneisen. In: Wiss. Zeitschr. d. TU Dresden. 10 (1961).
- PÄLCHEN, W.; WETZEL, H.-U.; LOBIN, M.; SELTMANN, R.: Spätvariszischer Magmatismus und Bruchtektonik im Osterzgebirge. Berlin. Exkursionsführer der GGW (31. Jahrestagung). (1984). S. 53-60.
- PFEIFFER, L.: Junge Vulkanite im Grenzgebiet der DDR und CSSR. Berling. GGW-Exkursionsführer, Tagung vom 24. bis 26.4.75 in Dresden. (1975). 40 S.
- PIETZSCH, K.: Verwitterungserscheinungen der Auflagefläche des Sächsischen Cenomans. In: Z. deutsch. geol. Ges., 65 (1913), 594-602.
- PIETZSCH, K.: Geologie von Sachsen. VEB Deutsch. Verlag d. Wiss., Berlin (1962). 870 S.
- REICHEL, W.: Döhlen Basin, In: Late Paleozoic and Caenozoic Continental, Guidebook of Excursions, Central Institute for Physics of the Earth, Potsdam, Sedimentation and Magmatism in the Southern Part of the G.D.R., (1985), 100-111.
- TGL 34 331/01: Fachbereichsstandard Geologie - Regionalgeologische Gliederung des Territoriums der DDR, ZGI. Berlin. (1983), 57 S.
- TRÖGER, K.-A.; BEHR, H.-J.; REICHEL, W.: Die tektonisch-fazielle Entwicklung des Elbe-Lineamentes im Bereich der Elbtalzone, Freiburger Forschungsheft C 241, Leipzig, (1969), S. 71-85.
- TRÖGER, K.-A.: Zur Paläontologie, Biostratigraphie und faziellen Ausbildung der unteren Oberkreide, Teil 2, Dresden, Abh. Staatl. Mus. Min. Geol. Dresden, (1969), 70 S.
- WALTHER, R.: Geologie von Mitteleuropa, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 561 S.

Literatur zu Abschn. 2, 3 & 4

- Baldauf, L. (1991): Untersuchungen zur Kationenumtauschkapazität und Kationenbelegung des Sorptionskomplexes saurer Waldböden über verschiedenen Grundgesteinen des Erzgebirges. Diss. TU Dresden 1991
- Baronius, G.; Hofmann, W. und Fiedler, H.J. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Weißeritztalhänge" (Bez. Dresden, DDR), Arch.Nat.schutz Landsch.forsch., Berlin 29,3, 159-173
- Blanck, E.; Melville, R. (1940/41) Über rezente und fossile Verwitterung des Gneises im Spessart, Erzgebirge, Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald, Chem. Erde, 13, 387-471
- Fiedler, H.J.; Hofmann, W.; Nebe, W. und Hunger, W. (1978): Standortskundlicher Exkursionsführer "Tharandt-Grillenburger Wald" -Bodennutzung und Bodenschutz- TU Dresden W 21-8
- Fiedler, H.J.; und Thalheim, K. (1988): Geologisch-pedologischer Exkursionsführer Osterzgebirge, Teil I: Geologie und Petrographie, Teil II: Bodengeologie und Pedologie
- Fiedler, H.J.; Thalheim, K.; Hofmann, W.; Hunger, W. und Ilgen, G. (1990): Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR). Chem. Erde 50, 269-277
- Hofmann, W. und Fiedler, H.J. (1984): Reliefabhängige Bodengenese auf Gneis im Sächsischen Erzgebirge. Chem. Erde 43, 205-215
- Karst, H. et al. (1965): Erläuterungen zu den Standortskarten des StFB Tharandt, Forstwirtschaftliches Institut Potsdam (unveröffentlicht), Aktualisierung 1987
- Linnemann, U. und Fiedler, H.J. (1991): Abriß der Geologie des Tharandter Waldes. Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges., Bd. 64, 29-47
- Pietzsch, K. (1913) Verwitterungserscheinungen der Auflagerungsfläche des sächsischen Cenomans, Z. dt. geol. Ges., 65, 594-602
- Pietzsch; K. (1934) Erläuterungen zum Meßtischblatt Dresden, 3. Auflage, (Abschn. Kreide)
- Sindowski, K.-H.(1961): Mineralogische, petrographische und

- geochemische Untersuchungsmethoden. in Bentz, A. Lehrbuch der angewandten Geologie, Bd.1 Allgemeine Methoden Stuttgart
- Störr, M.; Ruchholz, M. (1975) The Pre-Cenomanian Weathering Crust in the GDR, In: Störr (ed.) Kaolin Deposits of the GDR in the Northern Region of the Bohemian Massif, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald, 172-188
- Thalheim, K. (1988): Mineralogische und granulometrische Charakterisierung quartärer Deckschichten, insbesondere des Mittelsedimentes, unter Wald im Osterzgebirge. Diss. TU Dresden
- Thalheim, K. und Fiedler, H.J. (1989): Granulometrische und mineralogische Charakterisierung von Basalt-Braunerden im Osterzgebirge. Chem. Erde 49, 241-263
- Thalheim, K. und Fiedler, H.J. (1990): Merkmale für äolischen Einfluß in den känozoischen Deckschichten des Osterzgebirges (DDR). Chem. Erde 50, 147-154
- Vater, H.; Krauss, G. (1928): Vorschläge zu einer Kartographischen Abgrenzung der natürlichen Wuchsgebiet Sachsen. Thar. Forstl. Jb. 79, 314-378
- Wagenbreth, O.; Steiner, W. (1982) Geologische Streifzüge, VEB Dt. Verl. f. Grundstoffind., Leipzig, 204 S.

LÜSSGEBIET und TIEFLAND

ALTELMANN & WÜNSCHE (1950)	KOPP (1957)	ALTELMANN (1959)	LEMBKE (1959)	KOPP (1959)	BEHRENDT (1963), SOEWERS (1963), BOLBERG (1963), SCHULZ (1963), NITZ (1964), RHEBE, ALTELMANN & FIEDLER (1968), MAJORSKI (1969) u.a.
<p style="font-size: small;">Löss Sanddecke Leimdecke Tondecke</p>	<p style="font-size: small;">δ - Zone</p>	<p style="font-size: small;">Überschiebungsdecke</p>	<p style="font-size: small;">Überschiebungsdecke</p>	<p style="font-size: small;">Überschiebungsdecke</p>	<p style="font-size: small;">Überschiebungsdecke</p>
<p style="font-size: small;">Kryoturbations- Löss / Löss- Fließ- erde</p>	<p style="font-size: small;">ε - Zone</p>	<p style="font-size: small;">Fließ- erde</p>	<p style="font-size: small;">Penglaziale Deckense</p>		
<p style="font-size: small;">Kryoturbations- horizonte oder Fließebden (L.T. aus Löss) meist aus anderen Substraten, auch Schutte z.T. auch Schutte</p>	<p style="font-size: small;">ζ - Zone</p>	<p style="font-size: small;">Penglaziale Perstukturzone</p>			<p style="font-size: small;">Überschiebungsdecke</p>
	<p style="font-size: small;">η - Zone</p>				

AK Bodegeographisch d. DGB (1951)	Oberlage	Hauptlage	Mittelage	Basislage

Vorschlag des AK Bodensystematik der DBG (1991) zur Gliederung und Benennung der periglazialen Lagen (Deckschichten)

und Parallelisierung mit anderen Bezeichnungen

Bearbeiter: M. Altermann, 1992/93

M I T T E L G E B I R G E																				
AK Bodensystematik d. DBG (1991)	AK Bodensystematik d. DBG (1997)	ALTERMANN, LIEBEROTH, SCHWANECKE (1993/1998)			SCHWANECKE (1965) RUCHTER, RUSKE, SCHWANECKE (1970)		ALTERMANN & RABITZSCH (1977, 1982)		FEDLER, HOFMANN, PIETRUSKY (1970)		SCHRÖDER, FIEDLER (1977)		ALTERMANN, RUSKE (1970)		SEMMEL (1968)		SCHILLING, WIEFEL (1962)		HUNGER (1961)	
		Gliederung in Haupt- und Unterheiten		Beispiel für Unterheiten	Gliederung in periglaziale Umlagerungszonen															
Oberlage	zum Teil Holzrinde(n)	Oberdecke	Deck-schutt	Deck-fließ-erde ?	γ - Zone: obere periglaziale Deckzone	Deck-sediment	Deck-schutt	obere Deckschicht 1	Deck-position	Deck-schutt	obere Skelett-EB	Deck-schutt		Deck-folge	Deck-schutt	Deck-fließ-erde	lok. Isol. Decke			
Hauptlage	Decklage	Hauptdecke	Mittel-schutt	Mittel-fließ-erde	δ - Zone: mittlere periglaziale Deckzone (Hauptdeckzone)	Mittel-sediment	Mittel-schutt	Gebirgs-EB	obere Deckschicht 2	Mittel-position	Mittel-schutt	Mittel-obere Lage	Deck-schutt/ Deck-sediment	Haupt-folge	Schutt-fließ-erde	Haupt-fließ-erde	Schutt-fließ-erde	Fähr-erde	obere	
Mittellage	Mittellage(n)	Zwischen-decke	Zwischen-fließ-erde	Zwischen-schutt	ε - Zone: mittlere periglaziale Übergangzone	Zwischen-sediment	Fließ-erde				unterer Skelett-EB	Mittel-obere Lage	Mittel-schutt						untere	
Unterslage	Basislage(n)	Basis-decke	Basis-schutt	Basis-fließ-erde	ζ - Zone: untere periglaziale Deckzone (untere periglaziale Übergangzone)	Basis-sediment	Basis-schutt	Basis-fließ-erde	untere Deckschicht	Basis-position	Basis-schutt	Basis-schutt	Basis-schutt	Basis-folge	Basis-schutt	Basis-fließ-erde	Basis-fließ-erde	Schutt-decke		
		anliegendes Gestein	Fest-gestein	Gesteins-zersatz	η - Zone: Untergrund	Verwitterungszone	Auflagezone	Anliegendes Festgestein										Zer-satz		

b.w.

StreckenFahrplan

Dresden - Tharandt

Gültig bis 28. 05. 94

Zug-Nr.	Montag bis Freitag			Samstag			Sonntag und Feiertag			Dresden Hbf			Dresden-Plauen			Freital-Potschappel			Freital-Deuben			Freital-Hainsberg			Freital-Hainsberg West			Tharandt an			Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
S 15454	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,37	0,41	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56													
S 14460	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,52	3,56	4,01	4,03	4,06	4,08	4,11													
6550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,07	4,11	4,16	4,18	4,20	4,23	4,26	2.	nach Freiberg											
S 14400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,37	4,41	4,46	4,48	4,51	4,53	4,56													
6552	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,07	5,11	5,16	5,18	5,21	5,23	5,26	2.	nach Freiberg											
S 14404	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,22	5,26	5,31	5,33	5,36	5,38	5,41													
S 14406	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,37	5,41	5,46	5,48	5,51	5,53	5,56													
6554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,07	6,11	6,16	6,18	6,21	6,23	6,26		nach Freiberg											
S 14408	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,22	6,26	6,31	6,33	6,36	6,38	6,41													
S 14410	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,37	6,41	6,46	6,48	6,51	6,53	6,56													
E 4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
S 14412	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,53	6,57	7,02	7,04	7,07	7,09	7,12													
6556	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,07	7,11	7,16	7,18	7,21	7,23	7,26	2.	nach Freiberg											
S 14414	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,37	7,41	7,46	7,48	7,51	7,53	7,56													
6558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,07	8,11	8,16	8,18	8,21	8,23	8,26	2.	nach Freiberg											
S 14416	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,37	8,41	8,46	8,48	8,51	8,53	8,56													
E 4402	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,49	—	—	—	—	—	—	2b	nach Zwickau											
6560	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,07	9,11	9,16	9,18	9,21	9,23	9,26		nach Freiberg											
S 14418	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,37	9,41	9,46	9,48	9,51	9,53	9,56													
6562	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,07	10,11	10,16	10,18	10,21	10,23	10,26	2.	nach Freiberg											
S 14420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,37	10,41	10,46	10,48	10,51	10,53	10,56													
E 4404	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
6564	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,07	11,11	11,16	11,18	11,21	11,23	11,26		nach Freiberg											
S 14422	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,37	11,41	11,46	11,48	11,51	11,53	11,56													
6566	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,07	12,11	12,16	12,18	12,21	12,23	12,26	2.	nach Freiberg											
S 14424	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,37	12,41	12,46	12,48	12,51	12,53	12,56													
E 4406	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
6568	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,07	13,11	13,16	13,18	13,21	13,23	13,26	2.	nach Freiberg											
S 14426	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,37	13,41	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56													
6570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14,07	14,11	14,16	14,18	14,21	14,23	14,26	2.	nach Freiberg											
S 14428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14,37	14,41	14,46	14,48	14,51	14,53	14,56													
E 4408	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14,49	—	—	—	—	—	—	2b	nach Zwickau											
6572	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,07	15,11	15,16	15,18	15,21	15,23	15,26		nach Freiberg											
S 14430	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,22	15,26	15,31	15,33	15,36	15,38	15,41													
S 14432	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,37	15,41	15,46	15,48	15,51	15,53	15,56													
S 14434	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,47	15,51	15,56	15,58	16,01	16,03	16,06													
6574	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,07	16,11	16,16	16,18	16,21	16,23	16,26		nach Freiberg											
S 14436	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,22	16,26	16,31	16,33	16,36	16,38	16,41													
S 14438	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,37	16,41	16,46	16,48	16,51	16,53	16,56													
E 4410	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
6576	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17,07	17,11	17,16	17,18	17,21	17,23	17,26		nach Freiberg											
S 14440	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17,37	17,41	17,46	17,48	17,51	17,53	17,56													
6578	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18,07	18,11	18,16	18,18	18,21	18,23	18,26		nach Freiberg											
S 14442	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18,37	18,41	18,46	18,48	18,51	18,53	18,56	2.												
E 4412	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
6580	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19,07	19,11	19,16	19,18	19,21	19,23	19,26		nach Freiberg											
S 14444	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19,37	19,41	19,46	19,48	19,51	19,53	19,56													
6582	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,07	20,11	20,16	20,18	20,21	20,23	20,26		nach Freiberg											
S 14446	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,37	20,41	20,46	20,48	20,51	20,53	20,56													
E 4414	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau											
6584	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21,07	21,11	21,16	21,18	21,21	21,23	21,26		nach Freiberg											
S 14448	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21,37	21,41	21,46	21,48	21,51	21,53	21,56													
6586	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22,07	22,11	22,16	22,18	22,21	22,23	22,26		nach Freiberg											
S 14450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22,37	22,41	22,46	22,48	22,51	22,53	22,56													
E 4416	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22,49	—	—	—	—	—	—		nach Zwickau, täglich außer 20											
6588	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23,07	23,11	23,16	23,18	23,21	23,23	23,26		nach Freiberg											
S 14452	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23,37	23,41	23,46	23,48	23,51	23,53	23,56													
E 4418	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23,49	—	—	—	—	—	—		nach Chemnitz											

Unternehmen Zukunft
Die Deutschen Bahnen

Zeichenerklärung

- Bindestrich in der Mitte der Zugspalte = Zug fährt auf dem betreffenden Bahnhof durch
- 2b = Zug führt Gepäckabteil
- † = ver

Teilnehmer

Altermann, Doz.Dr. M.:
Kefersteinstr. 3, 06110 Halle

Baldauf, Dr. L.:
Dresdner Str. 37, 09557 Flöha

Bardua, Dipl. Geol. J.:
Naturbadstr. 49, 91056 Erlangen

Baronius, Dr. Kristin:
TU Dresden, Inst. f. Bodenkunde u. Standortslehre, 01737 Tharandt

Beckmann, Th.:
Dorfstr.6, 38179 Schwülper-Langenbüttel

Bibus, Prof.Dr. E.:
Univ. Tübingen, Geogr. Inst., Hölderlinstr. 12, 72074 Tübingen

Brandtner, W.:
Thür. LA f. Bodenforsch., Carl-Aug.-Allee 8-10, 99423 Weimar

Busche, Prof.Dr. D.:
Univ. Würzburg, Geogr. Inst., Am Hubland, 97074 Würzburg

Dahms-Arens, Dr.H.:
Geol. LA NW, De Greiff-Str. 195, PF 1080, 47710 Krefeld

Dietz, E.:
Gutenbergstr. 23, 90766 Fürth

Eiberweiser, Dipl.-Geogr. M.:
Univ. Regensburg. Inst.f.Phys.Geogr. Universitätsstr. 31,
93053 Regensburg

Eitel, Dr. B.:
Univ. Stuttgart, Geogr. Institut, Silcherstr.9, 70176 Stuttgart

Emmerich, Dr.K.-H.:
Hess. LA f. Bodenforsch., Leberberg 9, 65193 Wiesbaden

Felix.Henningsen, Prof.Dr.P.:
Univ. Münster, Inst.f.Geogr., Robert-Koch-Str. 26, 48149 Münster

Fiedler, Prof.Dr. H.J.:
TU Dresden, Inst.f.Bodenkunde u. Standortslehre, 01737 Tharandt

Gehrt, E.:
Niedersächs.LA f. Bodenforsch. Stilleweg 2,
30655 Hannover

Grottenthaler, Dr.W.:
Bayr. Geol. LA, Heßstr. 128, 80797 München

Grunert, Prof.Dr.J.W.:
Univ. Bonn, Geogr.Inst. Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn

Hardenbicker, Dr.U.:
Univ. Bonn, Geogr. Inst., Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn

Heinkele, Dr.Th.:
TU Cottbus, Lehrst. Bodenschutz u. Rekultivierung, PF 101344,
03013 Cottbus

Hoffmann, G.:
Geol. LA NW, De Greiff-Str. 195, 47803 Krefeld

Hofmann, Dr.W.:
TU Dresden, Inst.f.Bodenkunde u. Standortsl. 01737 Tharandt

Hummel, Dr.P.:
Geol. LA Baden-Württemb., Tennenbacherstr. 9-11, 79104 Freiburg

Hunger, Prof.Dr.W.:
Weißiger Höhe 3a, 01737 Tharandt

Janetzko, Dr. P.:
Geol. LA SH, Mercatorstr. 7, 24106 Kiel

Joisten, H.:
Sächs. LA f.Umwelt und Geol., Halsbrückerstr. 31a, 09599 Freiberg

Klinger, Dipl.-Chem.Th.:
TU Dresden, Inst.f.Bodenk. und Standortsl., 01737 Tharandt

Kösel, Dr.M.:
Geol. LA-Zweigstelle Stuttgart, Urbanstr.53, 70182 Stuttgart

Leßmann-Schoch, U.:
Siemensstr. 41, 50825 Köln

Linnemann, Dr. U.-G.:
Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Inst.f.Geowissenschaften,
Burgweg 11, 07749 Jena

Mahr, Dipl.-Geogr.A.:
Univ. Regensburg, Inst.f.Phys.Geogr. Universitätsstr. 31,
93053 Regensburg

Nebe, Prof.Dr.W.:
TU Dresden, Inst.f.Bodenk.und Standortsl. 01737 Tharandt

Niller, Dipl.-Geogr. H.P.:
Univ. Regensburg, Inst.f.Phys.Geogr. Universitätsstr. 31
93053 Regensburg

Opfermann, Dipl.-Forsting.M.:
TU Dresden, Inst.f.Bodenkd. u. Standortsl. 01737 Tharandt

Peterek, Dr. A.:
Univ. Erlangen-Nürnberg, Inst.f.Geol.u.Min., Schloßgarten 5,
91054 Erlangen

Poetsch, Dr. Th.:
Univ.Hamburg, Inst.f. Geogr., Bundesstr.55, 20146 Hamburg

Polte, M.:
Univ. Erlangen-Nürnberg, Inst.f.Geol. u. Min. Schloßgarten 5,
91054 Erlangen

Rösner, Dr. U.:
Univ. Erlangen-Nürnberg, Inst. f. Geogr., Kochstr. 4,
91054 Erlangen

Sabel, Dr. K. J.:
Hess. LA f. Bodenforsch., Leberberg 9, 65193 Wiesbaden

Schilling, Dr. B.:
Bayr. Geol. LA, Heßstr. 128, 80797 München

Schröder, Prof. Dr. D.:
Univ. Trier, Inst. f. Bodenkunde, PF 3825, 54296 Trier

Schwarz, Dr. T.:
TU Berlin, BH4,, FG Lagerstättenforsch., Ernst-Reuter-Pl. 1,
10587 Berlin

Semmel, Prof. Dr. A.:
Theod.-Körner-Str. 6, 65719 Hofheim a. Ts.

Skowronek, Prof. Dr. A.:
Univ. Bonn, Inst. f. Bodenk., Nußallee 13, 53115 Bonn

Stengel, Dr. I.:
Univ. Würzburg, Geogr. Inst., Am Hubland, 97074 Würzburg

Stremme, Prof. Dr. H.:
Bartelsallee 14, 24105 Kiel

Thalheim, Dr. K.:
Staatl. Mus. f. Min. u. Geol. Dresden, Augustusstr. 2, 01067 Dresden

Thiemeyer, Dr. H.:
Univ. Jena, Inst. f. Geogr., 07740 Jena

Traidl, Dipl.-Geogr. R.:
Univ. Regensburg, Inst. f. Phys. Geogr., Universitätsstr. 31,
93053 Regensburg

Völkel, Doz. Dr. J.:
Univ. Regensburg, Inst. f. Phys. Geogr. Universitätsstr. 31,
93053 Regensburg

Wall, H.: 90... Nürnberg

Weicken, Dr. H.-M.: Univ. Saarbrücken, FR Geogr,
66123 Saarbrücken

Weiske, Dipl.-Chem. A.:
TU Dresden, Inst. f. Bodenk. u. Standortsl., 01737 Tharandt

Wünsche, Prof. Dr. M.:
Gellertstr. 3, 09599 Freiberg

Zakosek, Prof. Dr. H.:
Univ. Bonn, Inst. f. Bodenk., Nußallee 134, 53115 Bonn